

Efectos secundarios de PrEP: ¡conozca los hechos!

No deje que la preocupación por los efectos secundarios le impida tomar PrEP.

Consejos para utilizar esta hoja: Los porcentajes a continuación son el porcentaje de personas que tomaron cada medicamento durante los estudios de investigación que informaron experimentar efectos secundarios. Tenga en cuenta de incluso los efectos secundarios más comunes son raros.

	Efectos positivos	Truvada emtricitabine-tenofovir	Descovy emtricitabine-tenofovir alafen	Apretude cabotegravir
	Te pone en control de tu salud sexual	✓	✓	✓
	Te protege de la infección por VIH	✓	✓	✓
	No requiere que recuerde tomar una pastilla			✓
	Ayuda a fortalecer tus huesos			✓
	Efectos secundarios	Truvada	Descovy	Apretude
Comunes	*Malestar estomacal, náuseas, vómitos, diarrea	< 6%	≤ 5%	4%
	**Dolor en las nalgas por la inyección	No reportado	0%	98%
Raros	Disminución de la función hepática	7%	No reportado	≤ 3%
	***Disminución significativa de la función hepática	< 1%	Bajo	≤ 5%
	Disminución de la densidad ósea	4%	1%	< 1%
	Aumento de peso	No reportado	No reportado	< 1%
	Pérdida de peso	3%	No reportado	No reportado

*Los síntomas estomacales desaparecen en las primeras dos semanas de tomar Truvada y Descovy. Tomar cualquiera de estos medicamentos antes de acostarse demostrado reducir los síntomas estomacales.

**El dolor en las nalgas disminuye con el tiempo y cada inyección se vuelve más fácil. Su proveedor puede recomendar que tome acetaminofeno o naproxeno según sea necesario para controlar el dolor.

***Más común en personas con antecedentes de hepatitis B u otras enfermedades hepáticas.