

在哪裡能獲得性傳播疾病 (STD) 檢查？

洛杉磯縣公共衛生部下屬的健康中心向沒有保險或醫療健保醫生的個人提供免費或低價服務。

安特洛普谷

Antelope Valley Public Health Center
335-B East Avenue K6
Lancaster, CA 93535
(661)-471-4861

東洛杉磯

Whittier Public Health Center
7643 S. Painter Avenue
Whittier, CA 90602
(562) 464-5350

洛杉磯都會區

- Central Public Health Center
241 N. Figueroa Street
Los Angeles, CA 90012
(213) 288-8204
- Hollywood/Wilshire Public Health Center
5205 Melrose Avenue
Los Angeles, CA 90038
(323) 769-7800

聖費爾南多谷

North Hollywood Public Health Center
5300 Tujunga Avenue
North Hollywood, CA 91601
(818) 766-3982

聖蓋博谷

Pomona Public Health Center
750 S. Park Avenue

Pomona, CA 91766
(909) 868-0235

南洛杉磯

- Martin Luther King, Jr. Center for Public Health
11833 South Wilmington Avenue
Los Angeles, CA 90059
(323) 568-8100
- Ruth-Temple Public Health Center
3834 S. Western Avenue
Los Angeles, CA 90062
(323) 730-3507

南灣

- Curtis R. Tucker Public Health Center
123 W. Manchester Blvd.
Inglewood, CA 90301
(310) 419-5325
- Torrance Public Health Center
711 Del Amo Blvd.
Torrance, CA 90502
(310) 354-2300

西洛杉磯

Simms/Mann Health and Wellness Center
2509 Pico Blvd. Rm.325
Santa Monica, CA 90405
(310) 998-3203

網站：www.GetProtectedLA.com

STD 熱線 1-800-758-0880

青少年診所資源：pocketguidela.org

STD 診所：publichealth.lacounty.gov/dhsp/STDclinics.htm

搜尋診所 →



STD 真相

性健康
盡在掌握



(下一頁) →

什麼是性傳播疾病 (STD) ?

STD 是通過性接觸傳播的感染。與 STD 感染者進行陰交、口交或肛交都可能感染。某些 STD 的感染者更有可能感染人類免疫缺陷病毒 (HIV)。

	<ul style="list-style-type: none">• STD 很普遍：1/2 的人在 25 歲前感染某種 STD。
	<ul style="list-style-type: none">• 很多 STD 感染者沒有任何症狀。只看一個人的外表無法判斷其是否感染 STD。但即便沒有症狀，STD 仍然能夠傳播。
	<ul style="list-style-type: none">• 若未經治療，STD 可能使母親和嬰兒（若您懷孕）遭受嚴重健康問題。您也可能因此失去受孕能力。
	<ul style="list-style-type: none">• 大多數 STD 可以通過藥物治癒。某些 STD 無法治癒，但能夠進行治療。

感染的症狀有哪些？

STD 感染通常沒有症狀。如果症狀出現，可能包括：

- **分泌物（滴狀或帶狀）**。男性可能會有白色、黃色或綠色液滴從陰莖流出。女性的陰道分泌物可能在顏色或氣味上發生改變。您的肛門分泌物也可能是 STD 的症狀。
- **潰瘍和腫物**。陰莖、陰道、肛門或口腔及其周圍區域出現的潰瘍、腫物、水疱或皮疹可能是感染 STD 的症狀。潰瘍可能是疱疹或梅毒的症狀。和皮膚顏色相同的腫物可能是生殖器疣。
- **瘙癢和灼痛**。陰莖、陰道或其它區域的瘙癢可能是蝨子（陰蝨）的症狀。陰道瘙癢可能是陰道炎的症狀。感染 STD 後，排尿時可能會有灼痛感。
- **皮疹**。疥瘡可能導致全身瘙癢。身體皮疹也可能是梅毒或嚴重愛滋病的症狀。
- **下腹部疼痛**。女性如有下腹痛、發熱、經間期陰道出血或性交時疼痛，則可能是盆腔炎 (PID) 的症狀。

如何保護自己免於感染 STD ?

- **每次性交都使用乳膠避孕套是保護自己免於感染 STD 的最佳途徑**。學習如何正確戴套。但是，要知道有些 STD 在使用避孕套的情況下仍能傳播。
- **限制性伴侶數量**。您的性伴侶越多，感染 STD 的風險越大。不進行性交是最安全的途徑。
- **與性伴侶交談**。性交前討論避孕套和健康狀況。
- **檢查症狀**。在性交前討論 STD。檢查自己和性伴侶是否有 STD 常見症狀。若您或您的性伴侶有任何症狀，則不要進行性交。**進行檢查**。
- **定期檢查**。您可能感染了 STD 卻無任何症狀。若您的性伴侶有變、有一位以上性伴侶或您的性伴侶可能與他人性交，則您最好每六個月進行一次檢查。讓您的性伴侶也進行檢查！
- **與醫生交談**並瞭解您是否需要暴露前預防 (PrEP) 來預防感染 HIV。若您已經感染 STD，醫生可能會將您性伴侶的藥物交給您，這稱為患者轉交性伴侶治療 (PDPT)。