

¿Cómo puedo protegerme?

Consejo #1: Use condones.

Los condones previenen que la sífilis se propague al evitar el contacto directo con las llagas. Al tocar las llagas que no están cubiertas todavía pueden contagiar la sífilis.

Consejo #2: Evite el alcohol y las drogas.

Beber alcohol y usar drogas puede conducir a relaciones sexuales poco seguras. Evitar el alcohol y las drogas puede ayudar a prevenir la propagación de la sífilis.

Consejo #3: Hable con su(s) pareja(s) sexual(es).

No siempre es obvio que una pareja sexual tiene sífilis porque las llagas de sífilis se pueden ocultar. A menos que sepa que su(s) pareja(s) sexual(es) ha sido examinada y tratada, puede estar en riesgo.

Consejo #4: Hágase la prueba regularmente.

Si usted tiene más de una pareja sexual, hágase la prueba cada 6 meses. La sífilis es curable.

¿Dónde puedo ir si necesito condones gratis?

WWW.LACONDOM.COM

Condomes gratuitos se pueden enviar desde el sitio web a su casa. También puede recogerlos en casi 300 sitios en el condado de Los Ángeles.

¿A quién llamo si necesito más información?

Condado de Los Ángeles,
Departamento de Salud Pública
División de Programas de VIH y ETS
Línea directa de ETS: 1-800-758-0880
www.publichealth.lacounty.gov/dhsp



Para obtener más información sobre la prevención del VIH y las ETS, visite www.GetProtectedLA.com/es.



Sífilis:

Lo Que Hombres Que Tienen Sexo con Hombres (HSH) Necesitan Saber



¿Qué es la sífilis?

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por bacterias (gérmenes). Muchos de los signos y síntomas son los mismos que otras enfermedades.

¿Cómo se contagia la sífilis?

La sífilis se transmite de persona a persona durante el sexo vaginal, anal u oral. También puede pasar a través del contacto piel a piel con una úlcera sifilítica. Las personas embarazadas con sífilis pueden también transmitir la enfermedad a su bebé durante el embarazo.

¿Cuáles son los signos de la sífilis?

La sífilis tiene diferentes etapas con diferentes signos. Muchas personas que tienen sífilis no muestran síntomas por años.

- **Sífilis primaria:** Una úlcera que no produce dolor, alrededor o dentro en el pene, la vagina, la boca o el ano que a veces dura 2-6 semanas y desaparece.
- **Sífilis secundaria:** Una erupción contagiosa puede aparecer en el cuerpo, las manos y los pies. Estos síntomas pueden aparecer y desaparecer durante aproximadamente 1 año.
- **Sífilis latente:** Los síntomas generalmente desaparecen por sí solos y la persona ya no es contagiosa.
- **Sífilis terciaria:** Muy raro. Los síntomas son más severos y causan daños graves a los órganos de su cuerpo.

¿Cómo se trata la sífilis?

La sífilis se trata y se cura fácilmente con antibióticos. Este medicamento se administra en forma de inyección. Asegúrese de que tanto usted como su pareja(s) sexual terminen el tratamiento antes de empezar relaciones sexuales de nuevo.


5 datos sobre la Sífilis en el Condado de Los Ángeles

Obtenga más información y esté al tanto de su riesgo.

Dato #1: En 2019, el 48% de los HSH con sífilis informaron haber conocido parejas sexuales en Internet en los últimos 12 meses.




Dato #2: En 2019, el 63% de los HSH con sífilis informaron haber tenido relaciones sexuales anónimas.



Dato #3: Los HSH de color son la comunidad más afectada en el condado de Los Ángeles.

Dato #4: En 2019, el 56% de los HSH en el condado de Los Ángeles tenían sífilis y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).



Dato #5: El riesgo de contraer el VIH es mayor para los HSH que tienen sífilis.

