


## SÍNTOMAS DE SÍFILIS

- El primer síntoma es una llaga sin dolor que puede aparecer dentro o cerca de la boca, genitales o áreas anales.
- Un segundo síntoma puede ser una erupción que puede aparecer en las palmas de las manos, en la planta de los pies o en el cuerpo entre las axilas de los brazos y la parte superior de los muslos.
- Los síntomas de la sífilis pueden aparecer y desaparecer.
- Para curar la sífilis, se requieren exámenes médicos y tratamiento.




## HASTE LA PRUEBA HOY

- Si experimenta signos o síntomas
- Si se está probando para otras ETS
- Si es sexualmente activo (se recomienda hacerse la prueba cada 6-12 meses)
- Si tiene relaciones sexuales sin protección (se recomienda hacerse la prueba cada 6 meses)
- Si tiene múltiples parejas sexuales (se recomienda hacerse la prueba cada 6 meses)
- Si eres un hombre que tiene sexo con otros hombres (se recomienda hacerse la prueba cada 3-6 meses)
- Si planeas quedar embarazada en el futuro

## Esa llaga podría ser **SÍFILIS**

Los casos de Sífilis y otras ETS están en aumento  
**INFÓRMATE. HASTE LA PRUEBA. CURATE.**  
Información y pruebas gratis y confidenciales:  
1-800-758-0880 • [www.publichealth.lacounty.gov/dhsp](http://www.publichealth.lacounty.gov/dhsp)



Es la salud de ellos también

# SÍFILIS

y otras ETS pueden lastimar a tú bebé

**INFÓRMATE. HASTE LA PRUEBA. CURATE.**

Información y pruebas gratis y confidenciales:

1-800-758-0880 • [www.publichealth.lacounty.gov/dhsp](http://www.publichealth.lacounty.gov/dhsp)



## SÍFILIS EN MUJERES

- La sífilis en mujeres está aumentando en el condado de Los Angeles
- Si una mujer está infectada con sífilis durante el embarazo, puede conducir a defectos de nacimiento, aborto espontáneo, nacimiento prematuro o muerte fetal
- **Buenas noticias:** la sífilis se puede tratar y curar incluso durante el embarazo con una inyección de antibióticos

## SÍ ESTAS EMBARAZADA:

- La atención prenatal es muy importante para mantener a usted y a su bebé saludables
- Debe hacerse la prueba de sífilis tres veces durante su embarazo: durante el primer trimestre, a principios del tercer trimestre (entre 28-32 semanas) y en el momento del parto
- Si no tiene un médico regular, llame a la línea gratuita de ETS (800) 758-0880 para averiguar dónde hacerse la prueba y recibir tratamiento gratis