

Sífilis congénita (sífilis de madre a bebé)

1. ¿Qué es la sífilis congénita?

La sífilis congénita (SC) es cuando una persona embarazada transmite la sífilis* a su bebé durante el embarazo o el parto. Si no se trata, puede causar problemas de salud graves para usted y su bebé.

2. ¿Cuáles son los síntomas de la SC?

La mayoría de las veces los síntomas pueden no aparecer al nacer, pero sin tratamiento, el bebé puede desarrollar problemas de salud graves en las primeras semanas después del nacimiento, o incluso años después.

Su bebé puede tener algunos de estos síntomas:

- Erupción cutánea
- Secreción de la nariz
- Ictericia (coloración amarillenta de la piel o los ojos)
- Deformación de los huesos
- Bajo recuento de glóbulos rojos
- Agrandamiento del hígado y del bazo
- Problemas con los nervios, como ceguera o sordera

3. ¿Cómo puede afectar a mi bebé?

Los efectos dependen de cuánto tiempo tuvo sífilis y cuándo o si recibió tratamiento. La SC puede causar: aborto espontáneo (perder el bebé durante el embarazo), muerte fetal (el bebé nace muerto), prematuridad (el bebé nace antes de tiempo), bajo peso al nacer o muerte poco tiempo después de nacer.

4. ¿Cómo puedo hacerme la prueba?


La única forma de saber que tiene sífilis es haciéndose la prueba. Una prueba de sífilis es parte de la atención prenatal (atención médica durante el embarazo). La atención prenatal es muy importante para que usted y su bebé se mantengan sanos. Debe hacerse la prueba de sífilis 3 veces durante su embarazo: durante el primer trimestre, el tercer trimestre (28 a 32 semanas) y en el momento del parto.

5. ¿Cómo se trata la SC?

La sífilis se puede tratar y curar, incluso durante el embarazo, con antibióticos (medicamento que mata los gérmenes). Asegúrese de que sus parejas sexuales también se hagan la prueba y se traten. Esto les ayudará a mantenerse saludables y evitará que propaguen la sífilis a otras personas o a usted (nuevamente). Los bebés con SC también pueden ser tratados y curados con antibióticos.

6. ¿Cómo puedo prevenir contagiar a mi bebé?

- Use un condón o barreras bucal cada vez que tenga sexo.
- Limite su(s) pareja(s) sexual(es).
- Vaya a sus visitas prenatales para hacerse pruebas y recibir tratamiento lo antes posible. Si no tiene un médico habitual, llame a la línea directa de ETS (800) 758-0880 para averiguar dónde hacerse la prueba y recibir tratamiento gratis.



Puntos Clave

- SC está en aumento en el condado de Los Ángeles.
- SC es cuando una persona embarazada transmite la sífilis a su bebé durante el embarazo o el parto.
- La atención prenatal es muy importante para encontrar y tratar la sífilis.
- La CS es curable y prevenible.

Para más información:

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles

www.publichealth.lacounty.gov/dhsp/

Departamento de Salud Pública de California

www.cdph.ca.gov/Programs/CI/D/DCDC/Pages/CongenitalSyphilis.aspx

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

www.cdc.gov/std/spanish/sifilis/stdfact-congenital-syphilis-s.htm

*Para obtener más información sobre la sífilis para las embarazadas, consulte las "Preguntas frecuentes sobre sífilis".

DHSP-STD-0023-02 (05/16/2022)