



# Պատվաստանյութեր

## Յղի անձանց համար



Եթե Դուք հղի եք, պատվաստանյութերը կարող են պաշտպանել ինչպես Ձեզ, այնպես էլ Ձեր երեխային կանխարգելվող հիվանդություններից: Պատվաստանյութերը սովորեցնում են Ձեր մարմնին ճանաչել վնասակար վիրուսները կամ բակտերիաները և ստեղծել հատուկ հակամարմիններ՝ Ձեզ և Ձեր երեխային առողջ պահելու համար: Երբ հղիության ընթացքում Դուք պատվաստվում եք, Ձեր հակամարմիններից որոշները մինչև ծնունդը փոխանցվում են Ձեր երեխային: Այս հակամարմինները Ձեր երեխայի համար ապահովում են պաշտպանություն ծանր հիվանդություններից կյանքի առաջին մի քանի ամիսների ընթացքում:



### Դուք պետք է իմանաք՝

- ◆ Պատվաստանյութերը հղիության ընթացքում անվտանգ են հղիների և նրանց երեխաների համար:
- ◆ Յղիության ընթացքում պատվաստվելը լավագույն միջոցն է նորածիններին լուրջ հիվանդություններից պաշտպանելու համար, հատկապես քանի որ նրանք դեռևս չեն կարող պատվաստվել:

### Պատվաստանյութեր, որոնք անհարժեշտ են հղիության ընթացքում

#### Դիֆթերիայի, փայտացման, կապույտ հազի (Tdap) դեմ պատվաստանյութ՝

- ◆ Ստացեք Tdap պատվաստանյութը յուրաքանչյուր հղիության 27-36-րդ շաբաթների ընթացքում Ձեր երեխային կապույտ հազից պաշտպանելու համար:
- ◆ Կապույտ հազը հատկապես վտանգավոր է նորածինների համար և կարող է կյանքի համար սպառնալից լինել:

#### COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութ՝

- ◆ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութ ստանալն անվտանգ է հղիության ցանկացած պահին:
- ◆ Յղի մարդիկ ավելի հավանական է, որ ծանր կհիվանդանան COVID-19-ով, քան ոչ հղիները:
- ◆ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը ժամանակին ստանալը ապահովում է Ձեր նորածնի պաշտպանությունը կյանքի առաջին ամիսների ընթացքում, մինչև որ Ձեր երեխան կկարողանա ինքը ստանալ COVID-19-ի դեմ իր պատվաստանյութը:


#### Շնչառական սինցիտիալ վիրուսի (RSV) դեմ պատվաստանյութ

- ◆ Յղի մարդիկ սեպտեմբերից մինչև հունվար կարող են ստանալ շնչառական սինցիտիալ վիրուսի դեմ պատվաստանյութի (RSV) մեկ դեղաչափի 32-36-րդ շաբաթների ընթացքում՝ շնչառական սինցիտիալ վիրուսից պաշտպանվելու համար:
- ◆ Նորածինների մոտ ծանր շնչառական սինցիտիալ վիրուսի (RSV) հիվանդությունը կանխելու համար խորհուրդ է տրվում RSV սեզոնի ընթացքում կամ մոր պատվաստում RSV-ով, կամ ծնվելուց անմիջապես հետո նորածնի պատվաստում nirsevimab-ով: Նորածինների մեծ մասը չի ունենա երկուսի կարիքը:



# Պատվաստանյութեր

## Յղի անձանց համար



### Գրիպի դեմ պատվաստանյութ՝

- ◆ Գրիպի դեմ պատվաստանյութ ստանալն անվտանգ է հղիության ցանկացած պահին:
- ◆ Յղի անձինք ավելի հավանական է, որ գրիպից կունենան ծանր հիվանդություն:
- ◆ Այլ տարիքի երեխաների համեմատ՝ 6 ամսականից փոքր երեխաների համար գրիպի պատճառով հոսպիտալացվելու վտանգն ամենամեծն է:
- ◆ Ժամանակին գրիպի դեմ պատվաստվելը ապահովում է պաշտպանություն Ձեր և Ձեր նորածնին կյանքի առաջին ամիսների ընթացքում, մինչև որ Ձեր երեխան կկարողանա ինքը ստանալ գրիպի դեմ իր պատվաստանյութը:

### Յեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստանյութ՝

Յղի անձինք, ովքեր նախկինում չեն պատվաստվել հեպատիտ Բ-ի դեմ, պետք է հղիության ընթացքում ստանան հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստանյութ, որպեսզի իրենց և իրենց երեխային պաշտպանեն հեպատիտ Բ-ի վիրուսից առաջացող վարակներից և հիվանդություններից: Յեպատիտ Բ-ն կարող է երկարատև վնաս պատճառել յարդին:

## Պատվաստանյութեր, որոնք անհրաժեշտ են նորածնին ծննդի պահին

### Յեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստանյութ՝

- ◆ Ձեր նորածինը պետք է ստանա հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստանյութի առաջին դեղաչափը ծնվելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում, որպեսզի նրան պաշտպանեք հեպատիտ Բ վարակից:

### Շնչառական սինցիտիալ վիրուսի (RSV) դեմ ներարկում (Nirsevimab)՝

- ◆ Եթե դուք չեք պատվաստվել շնչառական սինցիտիալ վիրուսի (RSV) դեմ պատվաստանյութով հղիության ընթացքում, կամ եթե Ձեր երեխան ծնվել է RSV պատվաստանյութ ստանալուց հետո 14 օրվա ընթացքում, Ձեր նորածինը պետք է ստանա nirsevimab-ի (Նիրսևիմաբ) մեկ դեղաչափ RSV-ի սեզոնից առաջ կամ դրա ընթացքում, որպեսզի պաշտպանվի ծանր հիվանդություններից: Շնչառական սինցիտիալ վիրուսը նորածնի հոսպիտալացման ամենատարածված պատճառն է:

Ձեր երեխան կստանա նաև հակաբիոտիկ աչքի կաթիլներ՝ աչքի վարակները կանխելու համար, կարվի վիտամին Կ-ի ներարկում և արյան պարզ թեստ՝ նորածինների ստուգման համար: Եթե հարցեր ունեք, դիմեք Ձեր հղիության խնամքի մատակարարին:



### Հանրային Առողջության գանգերի կենտրոն

Հավելյալ տեղեկությունների համար Հանրային Առողջության գանգերի կենտրոնը հասանելի է **1-833-540-0473** հեռախոսահամարով ամեն օր՝ առավոտյան 8-ից երեկոյան 8-ը՝ շաբաթը յոթ օր:

