

예방접종

면역 저하자

귀하가 면역 저하자일 경우 예방이 가능한 질병으로부터 자신을 보호하는 것이 더 어려울 수 있습니다. 백신 접종으로 예방할 수 있는 일부 질병에 감염되면 중증의 폐 감염 위험에 노출되고 병원 입원 또는 사망까지 초래할 수 있습니다.

백신은 감염으로부터 자신을 쉽고 효과적으로 보호하는 안전한 방법입니다. 면역 저자는 감염 또는 질병에 걸리면 회복이 힘들기 때문에 예방접종이 특히, 중요합니다. 하지만, 귀하의 면역력 수준에 따라 특정 백신을 접종하지 않거나 면역력이 충분히 획득할 때까지 접종시기를 늦춰야 할 수도 있습니다.

귀하의 의료 서비스 제공자와 권장 백신에 관해 상의하시기 바랍니다.

저는 어떤 백신을 맞아야 하나요?

- ◆ **COVID-19 백신**: 생후 6개월 이상의 모든 사람은 COVID-19 개량 백신을 최소 1회 접종을 권장합니다. 면역 저자는 이전 접종 횟수에 따라 2024-2025년 COVID-19 백신을 추가로 접종해야 할 수 있습니다.

이전에 백신을 **한 번도 맞지 않은** 사람은 mRNA 개량 백신 (화이자-바이오엔테크 또는 모더나 백신)을 3회 접종 또는 노바백스 COVID-19 개량 백신을 2회 접종 해야 합니다.

기존의 노바백스 백신, 단가 또는 2가 mRNA 백신을 맞은 사람은 이전 접종 횟수에 따라 COVID-19 개량 백신 1회 또는 2가 mRNA 개량 백신 2회를 접종해야 합니다.

- ◆ **독감 예방접종**: 매년 예방접종을 권장하며 특히, 가을 유행철에 접종하면 독감의 감염 위험을 줄여줍니다. 65세 이상 고령자 또는 18~64세이면서 장기 이식을 받았고 면역 억제제를 복용하는 경우 고용량 독감 백신에 대해 의료 서비스 제공자와 상의하시기 바랍니다.



(Korean)



COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health

예방접종

면역 저하자

- ◆ **RSV:** 75세 이상의 고령자는 1회 접종을 통해 호흡기세포융합 바이러스(RSV) 중증 질환으로부터 보호 받습니다. 면역 저하자와 같은 RSV 중증 질환 고위험군인 60-74세 이상의 성인은 RSV 백신 1회 접종할 것을 권장합니다.

생후 8개월 미만의 영아는 폐 감염으로부터 보호받기 위해 RSV 유행철(10월~3월) 전후로 니르세비맵(베이포투스, Beyfortus)을 1회 접종해야 합니다. RSV 질환 중증 고위험군에 속하고 두 번째 RSV 유행철 시기에 생후 8~19개월의 영유아도 니르세비맵을 1회 접종해야 합니다.

- **폐렴 백신:** 어린이와 성인에게 중증 감염을 일으킬 수 있는 여러 종류의 폐렴 구균에서 지켜주는 백신입니다. 어린이가 5세 이전에 기본접종 4회를 맞도록 권장합니다. 고학년 어린이와 성인을 위한 권장 백신 접종은 [여기](#)에서 확인할 수 있습니다.

백신은 어떻게 접종 받나요?

- ❖ 귀하의 의료 서비스 제공자 또는 약국을 방문하세요.
- ❖ 의료 서비스 제공자와 추가접종을 권장하는 지 상의하시기 바랍니다.
- ❖ 주치의가 없는 경우 publichealth.lacounty.gov/vaccines에서 무료 및 저렴한 비용의 백신 접종 보건소 목록에 대한 자세한 정보를 확인하세요.
- ❖ 가장 좋은 점은 대부분의 백신은 당일엔 동시접종할 수 있습니다!

권장 예방접종 목록은 [아래 사이트를 방문하세요](#)

www.cdc.gov/vaccines

공중보건 콜 센터

자세한 정보는 공중보건 콜 센터로 **1-833-540-0473**에 문의하시면 됩니다
(운영시간: 주 7일, 오전 8시 ~ 오후 8시까지).

