



لعرض هذه الأسئلة الشائعة وغيرها حول اللقاحات عبر الإنترنت، يُرجى زيارة [صفحة ويب لقاح كوفيد-19](#).

لمن يوصى بجرعات معززة من لقاح كوفيد-19؟

لأفضل حماية ضد مرض كوفيد-19، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن كل من يبلغ من العمر 5 أعوام أو أكبر يجب أن يتلقى جرعة معززة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتلقى البعض جرعة معززة ثانية. [\(انظر من يمكنه تلقي جرعة معززة ثانية؟ أدناه\)](#).

يعد تلقي لقاح معزز ضد كوفيد-19 أمرًا مهمًا لأنه يقوي مناعتك ويمنحك حماية أفضل من الإصابة بالمرض الحاد، ودخول المستشفى، والوفاة.

تعرف على المزيد على صفحة ويب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعنوان [لقاحات كوفيد-19 المعززة](#).

متى أتأهل لتلقي جرعة معززة؟

إذا كنت تبلغ من العمر 5 أعوام أو أكبر، فأنت مؤهل للحصول على جرعة معززة:

- بعد 5 أشهر من الجرعة الأخيرة من لقاح موديرنا أو فايزر الأساسي، أو
- بعد شهرين من تلقي جرعة لقاح جونسون آند جونسون الوحيدة.

إذا كان عمرك 18 عامًا أو أكثر، فقد تكون الجرعة المعززة هي أي لقاح كوفيد-19، ولكن يفضل استخدام فايزر أو موديرنا. يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا الحصول على جرعة فايزر المعززة فقط.

إذا كنت تعاني من نقص المناعة المعتدل أو الشديد، يجب أن تحصل على الجرعة المعززة في وقت أقرب. راجع صفحة ويب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعنوان [لقاحات كوفيد-19 لمن يعانون من نقص المناعة المعتدل أو الشديد](#) لمعرفة المزيد.

إذا لم تكن قد حصلت على أول جرعة معززة حتى الآن وحين يأتي موعد استحقاقها، فقد حان الوقت الآن للحصول على الجرعة المعززة.

يُرجى زيارة أداة ويب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعنوان [الحصول على جرعة كوفيد-19 المعززة](#) التفاعلية للمساعدة في تحديد ما إذا كان بإمكانك (أو طفلك) الحصول على واحد أو أكثر من جرعات كوفيد-19 المعززة.

استشر طبيبك إذا كانت لديك أسئلة.

من يمكنه تلقي جرعة معززة ثانية؟

الأشخاص المذكورون أدناه التالية مؤهلون لتلقي جرعة معززة ثانية ضد كوفيد-19 إذا مر ما لا يقل عن 4 أشهر منذ أول جرعة معززة:

- 50 عامًا وأكبر
- 12 عامًا وأكبر و [يعانون من نقص المناعة المعتدل أو الشديد](#)
- من 18 إلى 49 عامًا وتلقي جرعة جونسون آند جونسون وجرعة معززة

إذا كنت تبلغ من العمر 50 عامًا أو أكبر أو إذا كان عمرك 12 عامًا أو أكثر وتعاين من [نقص المناعة المعتدل أو الشديد](#) (وقد مرت 4 أشهر منذ أول جرعة معززة)، يجب أن تتلقى جرعتك المعززة الثانية الآن لتظل متلقيًا لكل لقاحات كوفيد-19 الخاصة بك. من المهم ملاحظة أن معدلات كوفيد-19 أخذة في الارتفاع، وأنت أكثر عرضة للإصابة بالمرض الحاد إذا أصبت بكوفيد-19.

إذا كان عمرك 18-49 عامًا وتلقيت لقاح جونسون آند جونسون لكل من جرعتك الأساسية والجرعة المعززة (وقد مرت 4 أشهر منذ أول جرعة معززة)، يجوز أن تتلقى جرعة معززة ثانية. لا يشترط اعتبار الجرعة المعززة الثانية جزءًا من الجرعات الكاملة. إذا كنت معرضًا



لخطر أكبر للإصابة بكوفيد-19، فاحصل على الجرعة المعززة الثانية الآن. إذا كنت تتمتع بصحة جيدة ولديك تعرض محدود للآخرين، فيمكنك التفكير في الانتظار.

يُرجى الاطلاع على صفحة ويب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعنوان [جرعات لقاح كوفيد-19 المعززة](#) لمزيد من المعلومات.

يُرجى زيارة أداة ويب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعنوان [الحصول على جرعة كوفيد-19 المعززة](#) التفاعلية للمساعدة في تحديد ما إذا كان بإمكانك (أو طفلك) الحصول على جرعة معززة ثانية.

يُرجى استشارة طبيبك إذا كانت لديك أسئلة.

متى يجب أن أتلقى جرعة معززة ثانية؟

إذا كنت في إحدى المجموعات التي يمكنها تلقي جرعة معززة ثانية، يمكنك اختيار الحصول عليها الآن أو الانتظار. فكر في وضعك والمخاطر والفوائد. يمكن لطبيبك مساعدتك في مراجعة خياراتك. لا تحتاج إلى جرعة معززة ثانية لكي تعتبر [متلقيًا لكل جرعات](#) لقاح كوفيد-19 الخاصة بك حاليًا.

توجد عوامل معينة قد تزيد من احتمالية إصابتك بمرض كوفيد-19 الحاد. إذا كنت مؤهلاً لتلقي جرعة معززة ثانية، فقد يكون من المفيد الحصول عليها الآن إذا كنت (أو إذا كان الشخص الذي تعيش معه):

- تعاني من نقص المناعة المعتدل أو الشديد
- [أكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الحاد](#)
- من المرجح أن تتعرض لكوفيد-19 من خلال عملك أو مكان إقامتك أو عوامل أخرى (مثل السفر كثيرًا أو المشاركة في التجمعات الكبيرة)
- في منطقة بها مستويات انتقال كوفيد-19 كبيرة إلى عالية
- إذا كان الشخص الذي تعيش معه غير محصن

قد تفكر في انتظار الحصول على جرعة معززة ثانية إذا كنت:

- أصبت بكوفيد-19 خلال الأشهر الثلاثة الماضية
- تتمتع بصحة جيدة ولديك تعرض محدود للآخرين

انظر صفحة ويب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعنوان [جرعات كوفيد-19 المعززة](#) لمزيد من المعلومات. استشر طبيبك إذا كانت لديك أسئلة.

ما مخاطر تلقي جرعة معززة؟

تشبه ردود الفعل بعد الجرعات المعززة تلك التي تحدث بعد الجرعات الأساسية. معظم الآثار الجانبية خفيفة إلى معتدلة وتستمر ليومين أو أقل. كما هو الحال مع الجرعات الأساسية، ونادرًا ما تكون الآثار الجانبية خطيرة. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحة ويب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعنوان [سلامة لقاحات كوفيد-19](#). تفوق فوائد تلقي جرعة معززة أي مخاطر معروفة ومحتملة.

هل سأحتاج إلى تقديم ملاحظة أو وصفة طبية من الطبيب لتلقي جرعة معززة؟

لا، لست بحاجة إلى ملاحظة من الطبيب أو إلى وصفة طبية لتلقي جرعة معززة. يمكنك تقديم تصديق ذاتي (تقرير ذاتي) إذا كنت مؤهلاً. عندما تذهب إلى الموقع، خذ معك دليل التطعيم مثل البطاقة البيضاء من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أو سجل التطعيم الرقمي. يُرجى زيارة صفحة ويب الصحة العامة بعنوان [كيفية الحصول على اللقاح](#) لمزيد من المعلومات.



أين أحصل على مزيد من المعلومات؟

- لطباعة أو عرض هذه الأسئلة الشائعة أو أسئلة شائعة حول موضوعات لقاح كوفيد-19 الأخرى، امسح رمز الاستجابة السريعة أو تفضل بالاطلاع على [الأسئلة الشائعة عن لقاح كوفيد-19](#).
- صفحة ويب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعنوان [الجرعات المعززة ضد كوفيد-19](#).
- [VaccinateLACounty.com](#) - بما في ذلك [جداول مواعيد لقاحات كوفيد-19](#) مع رسومات توضيحية لإظهار موعد استحقاق كل جرعة ومعلومات حول [كيفية الحصول على اللقاح](#).
- استشر طبيبك إذا كانت لديك أسئلة.

