



## COVID-19 疫苗 – 常見問題 (FAQ)

### 適用於免疫功能受損者



#### 為什麼免疫系統薄弱者需要接種更多的劑量？

免疫系統中度或嚴重受損者（如患有與血液相關的癌症或正在接受相應的癌症治療，接受了器官移植，患有某些自身免疫性疾病的個人）尤其容易受到 COVID-19 的侵害。他們比免疫系統正常者更容易感染 COVID-19。如果感染了 COVID-19，他們更有可能病得很重，並將病毒傳播給其他人。

此外，一些免疫系統薄弱的個人在接種標準的 COVID-19 初始系列疫苗劑量後，不會獲得足夠的保護。正因如此，建議他們接種更多劑量的疫苗，並在更短的時間間隔內接種其中的一些劑量。

#### 我應該接種多少劑疫苗？

如果你在 5 歲或以上，並且免疫系統中度或嚴重受損，你應該接種額外一劑 COVID-19 疫苗，來完成你的初始系列疫苗的接種。這意味著總共：

- 接種三劑輝瑞或莫德納疫苗 – 或 –
- 一劑強生疫苗，以及一劑輝瑞或莫德納疫苗。

如果你在 5 歲或以上，並且你的免疫系統中度或嚴重受損，你還應該至少接種一劑加強劑。

- 如果你的初始系列疫苗接種的是輝瑞或莫德納疫苗，你應該在接種第三劑疫苗的至少 3 個月後再接再劑加強劑疫苗，總共接種 4 劑疫苗。
- 如果你的初始系列疫苗接種的是強生疫苗，而額外劑疫苗接種的是輝瑞或莫德納疫苗，你應該在接種完輝瑞或莫德納疫苗的至少 2 個月後再接再劑加強劑疫苗，總共接種 3 劑疫苗。

如果你在 12 歲或以上，你應該在接種第一劑加強劑的至少 4 個月後再次接種第二劑加強劑輝瑞或莫德納疫苗，總共接種 5 劑疫苗。

請訪問美國疾病控制與預防中心(CDC)的互動式「[接種 COVID-19 疫苗加強劑](#)」工具，以幫助確定你（或你的孩子）何時可以接種一劑或更多 COVID-19 疫苗加強劑。

向你的醫生詢問根據你目前的治療計劃，接種額外劑和/或加強劑疫苗的最佳時機。如果你即將開始或重新開始免疫抑制治療，這一點尤為重要。

請參閱公共衛生局網頁 [ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules](https://ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules) 上的 [COVID-19 疫苗接種時間表](#)，瞭解所有適用於免疫功能受損者的建議接種的初始和加強劑量疫苗。

#### 我還應該採取哪些措施來保護自己？

除了接種 COVID-19 疫苗外，採取其他措施保護自己免於感染 COVID-19 也很重要：

- 諮詢你的醫生，瞭解有關預防 COVID-19 的藥物。目前，一種名為 Evusheld 的藥物可用於讓僅靠接種疫苗而無法產生足夠保護效果的個人免於感染 COVID-19。給藥方式是一次進行兩



## COVID-19 疫苗 – 常見問題 (FAQ)

### 適用於免疫功能受損者

針臀部注射。它的適用對象包括12歲及以上且體重至少為88磅的個人。有關更多資訊，請參閱網頁：[ph.lacounty.gov/covidmedicines](http://ph.lacounty.gov/covidmedicines)。

- 佩戴具有防護性的口罩，例如貼合面部的呼吸器（如 N95、KN95、KF94）或佩戴**雙層口罩**，以加強防護效果。儘量避免前往人群擁擠的室內區域或空氣流通不暢的地點。欲瞭解更多詳情，請參閱 [ph.lacounty.gov/reducerisk](http://ph.lacounty.gov/reducerisk) 和 [ph.lacounty.gov/masks](http://ph.lacounty.gov/masks)。
- 鼓勵和你在一起的人幫助保護你的健康。他們應該**保持最新的** COVID-19 疫苗接種狀態，並且若符合條件，接種**第二劑加強劑**疫苗，以及採取其他措施，減少他們感染和傳播 COVID-19 給你的**風險**。

### 我在哪裡可以獲得更多的資訊？



- 如需列印或查看本常見問題或其他關於COVID-19疫苗主題的常見問題，請掃描QR碼或訪問**COVID-19疫苗常見問題(FAQ)**。
- [VaccinateLACounty.com](http://VaccinateLACounty.com) – 包括 **COVID-19 疫苗接種時間表**，其中有圖表顯示應接種每一劑疫苗的時間，以及**如何接種疫苗**的信息。
- 欲瞭解更多資訊，請參閱美國疾病控制與預防中心 (CDC) 的網頁：「[適用於中度或重度免疫功能受損者的 COVID-19 疫苗](#)」。
- 如果你有任何問題，請諮詢你的醫生。