

# VACUNESE DESPUÉS DE LA INFECCIÓN

## AL COVID-19 SE RECOMIENDA LA VACUNACIÓN



Si acaba de tener COVID-19, aún se recomienda que se ponga al día con sus vacunas. Esto significa completar la serie primaria y recibir una dosis de refuerzo tan pronto como sea elegible. Estar vacunado y reforzado reduce el riesgo de volver a infectarse. Si se vuelve a infectar, es menos probable que se enferme gravemente. Cuando suficientes personas están vacunadas contra el COVID-19, el virus no se puede propagar tan fácilmente de persona a persona, lo que significa que toda nuestra comunidad estará más segura.



Aunque las vacunas no son tan efectivas para prevenir la infección por Ómicron, los refuerzos ayudan. Esta es la razón por la cual los refuerzos son muy recomendables para todas las personas mayores de 12 años.

Debe esperar hasta que se haya recuperado de su enfermedad (si tuvo síntomas) y su período de aislamiento haya terminado para vacunarse. Esto es para reducir el riesgo para los demás. Si ha tenido anticuerpos monoclonales para tratar la infección por COVID-19, debe esperar 90 días antes de recibir una dosis de la vacuna contra el COVID-19.



### ¿Qué vacunas puedo recibir para mi serie primaria y dosis de refuerzo?

	Pfizer	Moderna	Johnson & Johnson
Serie primaria	Mayores de 5 años Dos dosis con 21 días de diferencia	Mayores de 18 años Dos dosis con 28 días de diferencia	Todos los mayores de 18 años Una dosis
Serie de refuerzo	Para mayores de 12 años 5 meses después de su segunda dosis	Para mayores de 18 años 5 meses después de su segunda dosis	Para mayores de 18 años Al menos 2 meses después de completar la serie primaria Se prefiere una vacuna de Pfizer o Moderna para la dosis de refuerzo después de una vacuna primaria de J&J*. (Los adolescentes de 12 a 17 años solo pueden recibir un refuerzo de Pfizer).
Dosis adicional	Para personas de 5 años o más que tienen un sistema inmunológico moderado o gravemente debilitado	Para personas mayores de 18 años que tienen un sistema inmunológico moderado o gravemente debilitado	No se recomienda

\*Se prefieren las vacunas Pfizer y Moderna COVID-19 como refuerzos. Sin embargo, aún puede recibir un refuerzo de la vacuna J&J si lo prefiere o si no puede recibir una vacuna Pfizer o Moderna por razones médicas (como una reacción alérgica grave a un ingrediente de la vacuna).



¿Tiene preguntas sobre las vacunas contra el COVID-19? Visite [www.VacunateLosAngeles.com](http://www.VacunateLosAngeles.com)

