



COVID-19 疫苗的事實



為什麼要接種COVID-19疫苗？

- 接種疫苗可以降低你因COVID-19罹患重病、住院或死亡的風險。它還可以降低罹患長期COVID症狀的風險。
- 你需要接種**所有推薦的劑量**（包括加強劑）來獲得最好的保護作用。

誰可以接種疫苗？

5歲及以上的個人

- 每個人均可以**免費**接種COVID-19疫苗，即使你沒有健康保險。
- 你不會被問及關於移民身份的問題。
- 建議所有人接種疫苗，包括孕婦或哺乳婦女，以及已經患過COVID-19的個人。



建議接種哪種 COVID-19 疫苗？

	輝瑞疫苗	莫德納疫苗
建議接種疫苗的群體：	5歲及以上年齡的個人	18歲及以上年齡的個人
疫苗初始劑量：	2 劑：中間間隔3-8周	2 劑：中間間隔4-8周
第一劑加強劑接種時間	5個月之後	5個月之後
第二劑加強劑接種時間	50歲及以上：4個月之後	50歲及以上：4個月之後




如果你的**免疫功能受損**，你可能需要接種額外的劑量——請諮詢你的醫生，或查看：

ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules獲取更多資訊。

在**某些情況**下，強生公司的疫苗可用於18歲及以上的個人。它的接種流程是先接種一劑單劑疫苗，兩個月後再接種一劑加強劑（三種疫苗中的任何一種）。此外，50歲及以上的個人或接種了兩劑強生疫苗的18歲及以上的個人，可以接種輝瑞或莫德納疫苗作為第二劑加強劑。

COVID-19 Vaccination Record Card			
Last name		First Name	
Date of Birth		Medical Record Number	
Vaccine	Product/Lot #	Date	Clinic Site
1st Dose COVID-19		__/__/__	
2nd Dose COVID-19		__/__/__	
3rd Dose COVID-19		__/__/__	





COVID-19 疫苗的事實

如何接種疫苗

在整個洛杉磯縣有數百個疫苗接種點——許多會在週末和晚上開放，且無需預約。

在你附近找到一處疫苗接種點：

- 請訪問 [VaccinateLACounty.com](https://www.vaccinatelacounty.com)；或致電**833-540-0473**，服務時間為：每天早上8點至晚上8點半。
- 你也可以致電2-1-1，或者也可以諮詢你的醫生或當地藥劑師。
- 可提供免費交通工具和居家接種疫苗服務。

未成年人需要父母或法定監護人的同意才能接種疫苗。



疫苗有哪些副作用？

- 接種疫苗後出現副作用是很常見的，這些副作用可能包括：手臂酸痛或紅腫、感到疲倦、發燒、發冷、頭痛或肌肉酸痛。它們並不意味著你感染了COVID-19。不是每個人都會出現副作用。
- 出現副作用表明你的免疫系統正在**建立保護作用**。副作用可能會影響你進行一些日常活動的能力，但它們應該會在接種疫苗後的一兩天內消失。
- 嚴重的副作用很罕見，而且大多數是可以治療的。



疫苗的安全性如何？

- 接種疫苗不會讓你感染COVID-19。沒有一種批准使用的疫苗含有導致COVID-19的病毒。
- 這些疫苗已在數萬人身上進行了測試，其中包括有色人種、老年人和有健康問題的個人，測試結果發現疫苗是**安全且有效**的。
- 自2020年12月以來，已有**數億人**安全接種了COVID-19疫苗。
- COVID-19疫苗將繼續接受美國歷史上最**嚴格的安全監測**。
- 沒有證據表明COVID-19疫苗會導致生育問題。它們對孕婦是安全的，且妊娠專家建議孕婦接種疫苗。

