




متى يجب أن أحصل على الجرعة الثانية من اللقاح؟

إذا تلقيت لقاح فايزر أو موديرنا ضد كوفيد-19، فستحتاج إلى جرعتين أساسيتين. يعتمد أفضل وقت للجرعة الثانية من جرعاتك الأساسية على حالتك.

إذا كان عمرك أقل من 65 عامًا ولا تعاني من ضعف في الجهاز المناعي:

- قد تستفيد من تلقي جرعتك الثانية الأساسية بعد 8 أسابيع من الجرعة الأولى، لا سيما إذا كنت ذكرًا بين 12 و39 عامًا لأن قضاء وقت أطول بين الجرعتين الأولى والثانية قد يزيد من الحماية التي يوفرها اللقاح ويقلل أخطار الإصابة بالتهاب عضلة القلب النادر. الذكور الأصغر سنًا (الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و39 عامًا) هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب عضلة القلب.
- يجب أن تتلقى جرعتك الثانية الأساسية مبكرًا إذا احتجت إلى الحماية الكاملة بشكل أسرع: 3 أسابيع على الأقل بعد الجرعة الأولى من فايزر وما لا يقل عن 4 أسابيع بعد الجرعة الأولى من موديرنا. ومن الأمثلة على ذلك وجود انتشار كبير حيث تعيش أو تعمل أو تسافر؛ و/أو إذا كنت معرضًا لخطر أكبر للإصابة بالمرض الحاد.
- استشر طبيبك إذا لم تكن متأكدًا من التوقيت الأفضل لحالتك.

إذا كنت تعاني من نقص المناعة المعتدل أو الشديد وعمرك 65 سنة وأكبر:



- يجب أن تتلقى جرعتك الثانية الأساسية مبكرًا - على الأقل 3 أسابيع بعد الجرعة الأولى من فايزر وما لا يقل عن 4 أسابيع بعد الجرعة الأولى من موديرنا.
- يجب أيضًا أن تتلقى جرعة أساسية ثالثة بعد 4 أسابيع على الأقل من جرعتك الثانية الأساسية إذا كنت تعاني من نقص المناعة.

إذا تأخرت في تلقي جرعتك الثانية، فحاول الحصول عليها في أقرب وقت ممكن. يمكنك التقاط جرعات اللقاح من حيث توقفت. لست بحاجة للبدء من جديد.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على [.ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules](https://ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules)