




# COVID-19 疫苗：辉瑞和莫德纳

## 接种第二剂初始剂量疫苗的时机

### 我应该什么时候接种第二剂疫苗？

接种第二剂初始剂量的最佳时间取决于你的个人情况。




#### 如果你的年龄在 65 岁以下，并且你的免疫系统也不薄弱：

- 在接种第一剂初始剂量疫苗的 8 周后再接种第二剂初始剂量疫苗可能对你有好处，尤其是如果你属于 12-39 岁的男性群体。这是因为若接种第一剂和第二剂初始剂量疫苗的间隔时间较长，可能会增加疫苗提供的保护力度，并降低本已罕见的心肌炎（心肌的炎症）发生的风险。年轻男性（12-39 岁）患心肌炎的风险最高。
- 如果你需要更早地获得最全面的保护，你应该更早地接种第二剂初始剂量疫苗：即在接种第一剂辉瑞疫苗的至少 3 周后，或在接种第一剂莫德纳疫苗的至少 4 周后。需要更早接种的实例包括，如果你在生活、工作或旅行的地点有很高的病毒传播率，并且/或如果你罹患严重疾病的风险更高。
- 如果你不确定哪个接种时机最适合你个人的情况，请咨询你的医生。

#### 如果你的免疫功能中度或严重受损且/或年龄在 65 岁及以上：

- 你应该更早地接种第二剂初始剂量疫苗——即在你接种第一剂辉瑞疫苗的至少 3 周后，或在你接种第一剂莫德纳疫苗的至少 4 周后。
- 如果你的免疫功能受损，你还应该在接种第二剂初始剂量疫苗的至少 4 周后再接种第三剂初始剂量疫苗。



如果你接种第二剂疫苗的时间晚了，请尽量尽快接种。你可以继续接种所停止的疫苗剂量。你不需要重新从第一剂疫苗开始接种。

欲了解更多信息，请参阅 [ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules](https://ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules)。