

猴痘：須知資訊

猴痘是一種由猴痘病毒引起的傳染病。任何與猴痘患者有過密切個人接觸的人都有感染風險。

猴痘的傳播方式？

已知猴痘可透過密切、親密和/或長時間接觸傳播，包括：

- 與猴痘患者的皮疹、結痂或體液有直接皮膚接觸
- 接觸猴痘患者使用過的物品和織物
- 接觸猴痘患者的呼吸道分泌物

傳播可能在以下情況下發生：

- 性行為和其他親密接觸，包括接吻、按摩、擁抱
- 共用未經清潔的織物和物品（如衣服、床上用品、毛巾、性玩具）
- 長時間、近距離、面對面的接觸，例如長時間（約 3 小時或更長時間）非常近距離地面對面交談
- 住在一所房子裡、共用一張床或是照顧猴痘患者

猴痘患者可能從症狀開始直到皮疹痊癒、結痂脫落並長出一層新皮膚之前將猴痘傳播給他人。傳染期通常會持續 2 到 4 週。

患有猴痘的孕婦會透過胎盤將病毒傳播給胎兒。

猴痘不會透過偶然交談或經過猴痘患者身邊而傳播。

猴痘有哪些症狀

主要症狀

皮疹



皮疹可能：

- 看起來像丘疹、痘胞、水疱、瘡或結痂
- 出現在身體的任何部位，包括生殖器官、肛門、口腔、手部和臉部
- 僅出現在一個部位，或可能遍布全身
- 發癢或疼痛（尤其是在口腔或肛門內時）

其他症狀

類似流感的症狀



發熱/發冷



重度虛弱、肌肉酸痛和頭痛



淋巴結腫大

- 類似流感的症狀可能在皮疹開始之前的 1-4 天或皮疹開始之後出現
- 不是所有人都會出現這些症狀

症狀通常會在接觸後 **5-21** 天開始出現

與您的醫師聯絡

如果您身體的任何部位新出現無法解釋的皮疹或病變，請與您的醫師聯絡。在您接觸過猴痘患者或疑似患者的情況下，尤其應與醫師聯絡。

如果您沒有醫師：

- 請撥打公共衛生局呼叫中心 (Public Health Call Center) 電話 1-833-540-0473（每天早上 8:00 至晚上 8:30），或是
- 前往您附近的 [公共衛生局性健康診所 \(Public Health Sexual Health Clinic\)](#)。



掃描 QR 碼查找性健康診所

有關猴痘的更多資訊，請瀏覽：

ph.lacounty.gov/Monkeypox 8/26/2022

