



# COVID-19 ブースター接種 感染予防効果を高めましょう!

## COVID-19重症化予防効果を高めましょう

- 最新の(2価)PfizerおよびModernaのCOVID-19ワクチンは従来の新型コロナウイルスと最近のオミクロン株の両方に対応することができます。
- 最新のブースターワクチンを接種することで現在流行中、および今年の冬に流行すると予想されている変異株に対する免疫が強化されます。その結果、COVID-19の最悪の事態から効果的に身を守ることができます。



最終ワクチン接種日から最低2ヶ月経過している場合は最新のブースターワクチンを接種してください。



すでに従来型のブースター接種を一回以上受けている場合でも、**5歳以上の方は最新のブースター接種を受ける必要があります。**最新のブースター接種を受ける時期は初回接種の完了日、または従来型ブースターワクチンを受けてから最低2ヶ月経過した後です。

65歳以上の方々にとってブースターワクチンを受けるのは**特に重要になります。**

- 副反応は初回接種を受けた後に出るものとよく似ています。副反応のほとんどが軽度から中等度で1~2日もすれば治ります。
- 生後6ヶ月から4歳までのお子様はブースターワクチンを接種することはまだできません。しかし、ワクチン接種をまだ受けていないお子様は今すぐ初回接種を受けさせるべきです。
- Novavaxのブースターワクチンは、まだブースター接種を受けたことがなく、PfizerやModernaのワクチンを受けることができない18歳以上の方が対象となります。初回接種を完了してから6ヶ月後に投与されます。
- 新型コロナワクチンと同時に**インフルエンザの予防注射を受けることもできます!**

過去に**COVID-19に感染したことがある方でもブースター接種が推奨されています**

- ワクチン接種を受けることで予防効果をさらに高めることができます。**
- ブースター接種を受けるのは隔離を終了してからにしましょう。発症日または(無症状だった場合は)検査で陽性反応が出た日から3ヶ月待つという選択肢もあります。その3ヶ月間で新型コロナウイルスに再度感染する確率は低いとされているためです。また、感染していた時期とワクチンを受けるまでの間隔を長くあけるほど免疫反応が増強することにつながるとも考えられています。



**ワクチンは無料で接種いただけます- 医療保険は必要ありません**

- 滞在資格などに関する質問はされません。

詳細は**VaccinateLACounty.com**にアクセスするか**1-833-540-0473**まで電話でお問合せください。

