



# Бустеры вакцины от COVID-19

## Укрепите свою иммунную защиту!

### УКРЕПИТЕ СВОЮ ИММУННУЮ ЗАЩИТУ ПРОТИВ ТЯЖЕЛОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19

- Обновленные (бивалентные) вакцины против COVID-19 производства компаний Pfizer и Moderna обеспечивают защиту от заражения первоначальным штаммом вируса COVID, а также его последними Омикрон-вариантами.
- Прививка бустерной (стимулирующей) дозой укрепляет ваш иммунитет против вариантов вируса, наблюдаемых в настоящее время и ожидаемых нынешней зимой. Она обеспечивает вас лучшей защитой от наихудших последствий заражения COVID-19.



### ЕСЛИ ПРОШЛО ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 2 МЕСЯЦА С МОМЕНТА ПРИВИВКИ ПОСЛЕДНЕЙ ДОЗОЙ ВАКЦИНЫ, ПРИВЕЙТЕСЬ ОБНОВЛЕННЫМ БУСТЕРОМ УЖЕ СЕЙЧАС



**Всем лицам в возрасте от 5 лет** следует привиться обновлённым бустером даже если они уже получили одну или более оригинальные бустерные дозы. Обновленным бустером необходимо привиться по меньшей мере через 2 месяца после получения последней дозы основной серии или последней оригинальной бустерной дозы.

Прививка бустером **особенно важна** для людей возраста 65 лет и старше.

- Побочные эффекты бустерной дозы схожи с побочными эффектами, возникающими после введения доз основной серии. Большинство побочных эффектов являются слабыми или умеренными и длятся 1-2 дня.
- Дети в возрасте от 6 месяцев и до 4 лет включительно пока не могут привиться бустером. Но если они еще не вакцинированы от COVID, им следует получить основную серию вакцины уже сейчас.
- Бустерная доза вакцины Novavax доступна для людей в возрасте 18 лет и старше, которые не могут привиться вакциной Pfizer или Moderna и не прививались бустерными дозами в прошлом. Она вводится через 6 месяцев после завершения основной серии.
- Вы можете **привиться вакциной от гриппа одновременно** с вакциной от COVID!

### ПРИВИВКА БУСТЕРОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ COVID

- **Вакцинация обеспечивает дополнительную защиту.**
- Подождите окончания своего периода изоляции, прежде чем отправиться на получение прививки бустером. Вы также можете рассмотреть возможность отложить прививку бустером на 3 месяца с начала появления симптомов или сдачи анализа с положительным результатом (при отсутствии симптомов). Вы с меньшей вероятностью повторно заразитесь COVID в течение 3 месяцев. Кроме того, более продолжительный интервал между инфицированием и вакцинацией может обеспечить лучший иммунный ответ.



FREE

### ВАКЦИНЫ БЕСПЛАТНЫ- ВАМ НЕ НУЖНА МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

- Вас не спросят о вашем иммиграционном статусе.

Посетите [VaccinateLACounty.com](https://www.vaccinateLACounty.com) или позвоните по номеру 1-833-540-0473 для получения дополнительной информации.

