



ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 – Ответы на часто задаваемые вопросы БУСТЕРНЫЕ ДОЗЫ

Для онлайн-просмотра этих и других ответов на часто задаваемые вопросы о вакцине посетите [веб-страницу о вакцине от COVID-19](#).

Почему важна ревакцинация бустерными (стимулирующими) дозами вакцины от COVID-19?

Бустеры используются для многих различных вакцин с целью обеспечения постоянной защиты от тяжелого заболевания.

[Вакцины против COVID-19 продолжают эффективно защищать](#) людей от развития тяжелого заболевания. Однако со временем уровень защиты может ослабнуть. Ревакцинация бустерными дозами вакцины против COVID-19 важна для укрепления вашего иммунитета. Она обеспечивает вас лучшей защитой от развития тяжелого заболевания, госпитализации и даже смерти.

Привейтесь рекомендованной вам бустерной дозой (см. ниже).

Что представляет из себя обновленный бустер вакцины от COVID-19?

Обновленный бустер, также известный как «бивалентный» бустер, представляет собой дозу вакцины, усовершенствованной с целью борьбы как с первоначальным штаммом вируса COVID-19, так и с его Омикрон-подвариантами (BA.4 и BA.5).

Обновленные бустеры могут помочь восстановить защиту от вируса COVID-19, которая ослабла со временем, а также могут помочь обеспечить более широкую защиту от заражения новыми вариантами вируса.

Все бустерные дозы вакцин Pfizer и Moderna являются обновленными (бивалентными). Оригинальные (моновалентные) бустеры вакцин Pfizer и Moderna более недоступны. Бустер вакцины Novavax является оригинальным (моновалентным).

Кому следует привиться бустерными дозами вакцины от COVID-19?

Обновленные (бивалентные) бустеры рекомендованы всем лицам в возрасте от 6 месяцев, за одним исключением. Дети в возрасте 6 месяцев – 4 лет, завершившие вакцинацию основной серией вакцины Pfizer, в настоящее время не имеют права на ревакцинацию бустерной дозой.

Прививка одной обновленной бустерной дозой рекомендована не менее чем через 2 месяца после прививки последней дозой вакцины против COVID-19 (последней дозой основной серии или последней оригинальной [моновалентной] бустерной дозой). Это не зависит от того, сколько оригинальных (моновалентных) бустеров вы уже получили или какой именно вакциной прививались. Дети возраста 11 лет и младше получают меньшую дозу обновленного бустера по сравнению с дозой для подростков и взрослых.

Лица в возрасте 5 лет и старше

- Дети в возрасте 5 лет, завершившие вакцинацию основной серией вакцины Moderna, могут привиться обновленным бустером Pfizer или Moderna.
- Дети в возрасте 5 лет, завершившие вакцинацию основной серией вакцины Pfizer, могут привиться обновленным бустером Pfizer.
- Лица возраста 6 лет и старше могут привиться обновленным бустером Pfizer или Moderna.

Дети в возрасте 6 месяцев – 4 лет

- Дети, завершившие вакцинацию основной серией вакцины Moderna, могут привиться обновленным бустером Moderna.
- Дети, завершившие вакцинацию основной серией вакцины Pfizer, в настоящее время не имеют права на ревакцинацию бустерной дозой. Примечание: Основная серия вакцины Pfizer для данной



ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 – Ответы на часто задаваемые вопросы БУСТЕРНЫЕ ДОЗЫ

возрастной группы теперь включает в себя бивалентную (обновленную) дозу вакцины в качестве 3-й дополнительной.

Альтернативный бустерный вариант для некоторых людей в возрасте 18 лет и старше

Лица возраста 18 лет и старше могут привиться вакциной Novavax (моновалентной) в качестве бустерной дозы вместо рекомендованного обновленного бустера Pfizer или Moderna, если они отвечают всем нижеперечисленным критериям:

1. Они не могут или не желают прививаться обновленным бустером (например, если у них сильная аллергия на компоненты мРНК-вакцины Pfizer и Moderna; И
2. Они завершили вакцинацию основной серией; А ТАКЖЕ
3. Они не прививались бустерной дозой в прошлом.

Бустер Novavax вводится не ранее чем через 6 месяцев с момента получения последней дозы основной серии.

Воспользуйтесь интерактивным инструментом «[Узнайте, когда привиться бустерной дозой](#)» на веб-странице CDC [Привейтесь всеми необходимыми дозами вакцины против COVID-19, в том числе бустерами](#), чтобы узнать, когда вы (или ваш ребенок) можете получить бустерную прививку.

Проконсультируйтесь со своим врачом, если у вас возникнут вопросы.

Могу ли я привиться бустерной дозой, если я переболел COVID-19?

Да, вам следует привиться бустером, если вы переболели COVID-19. Вам рекомендуется привиться всеми необходимыми дозами вакцины против COVID-19, в том числе бустерными, даже если вы уже переболели COVID-19, поскольку ревакцинация обеспечивает дополнительную защиту.

Если вы недавно перенесли COVID-19, вы можете рассмотреть возможность отложить прививку дозой вакцины (основной серии или бустера) на 3 месяца с момента появления симптомов или получения первого положительного результата анализа (если у вас не было симптомов). Ваш риск повторного заражения менее вероятен в первые несколько месяцев после недавно перенесенной инфекции COVID-19. Более длительный период времени между заражением и прививкой вакциной также может обеспечить лучший иммунный ответ. Тем не менее, вам не следует откладывать прививку дозой вакцины более чем на 3 месяца. Безопаснее будет привиться вакциной раньше.

Если вы в данный момент заражены COVID-19, вам следует дождаться по меньшей мере окончания изоляции, прежде чем прививаться дозой вакцины COVID-19. Это необходимо для того, чтобы вы не заразили вирусом COVID-19 медицинских работников и прочих лиц, когда отправитесь на вакцинацию.

Каковы риски от ревакцинации бустером?

Реакция на бустерные дозы схожа с реакцией на основные дозы вакцины. Большинство побочных эффектов являются легкими или умеренными и проходят в течение 2 дней или раньше. Как и в случае с основной серией, тяжелые побочные эффекты возникают редко. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу CDC «[Безопасность вакцин от COVID-19](#)». Польза от получения бустерной дозы перевешивает любые известные и возможные риски.



ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 – Ответы на часто задаваемые вопросы БУСТЕРНЫЕ ДОЗЫ

Нужно ли показать справку или рецепт от врача, чтобы привиться бустерной дозой?

Нет, вам не нужно иметь справку или рецепт от врача, чтобы привиться бустерной дозой. Возьмите с собой подтверждение вакцинации, например, белую карту CDC или цифровую карту вакцинации, когда отправитесь в пункт. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу Департамента общественного здравоохранения «[Как привиться вакциной](#)».

Где можно получить дополнительную информацию?



- Чтобы распечатать или просмотреть эти ответы на часто задаваемые вопросы или ответы на часто задаваемые вопросы на другие темы о вакцине от COVID-19, отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке «[Ответы на часто задаваемые вопросы по вакцине от COVID-19](#)».
- Веб-страница CDC «[Привейтесь всеми необходимыми дозами вакцины против COVID-19, в том числе бустерами](#)»
- [VaccinateLACounty.com](#), включая [график вакцинации от COVID-19](#) с изображениями, демонстрирующими, когда необходимо привиться каждой дозой, и информацию о том, [как привиться вакциной](#).
- Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь со своим врачом.

