



# COVID-19 백신 - 자주 묻는 질문 (FAQ)

## 면역력 저하된 사람

### 면역력이 저하된 사람은 왜 다른 백신 접종을 권장 받습니까?

중증도에서 위중증의 면역력 저하자(예: 혈액 관련 암 또는 특정 암 치료, 장기 이식 및 특정 자가면역 질환)는 특히 COVID-19 감염에 취약합니다. 면역력 저하는 면역 체계가 정상인 사람보다 COVID-19에 감염될 가능성이 더 높습니다. 그리고 COVID-19에 감염될 경우, 중증화로 진행될 수 있고 타인에게 바이러스를 전파할 가능성이 더 높습니다.

면역 체계가 약화된 사람 중에는 일반 COVID-19 기본 접종만으로 충분한 면역력을 형성하지 못하는 경우가 있습니다. 최선의 보호를 받기 위해서는 백신의 접종 횟수를 늘려야 합니다.

### 저는 백신을 몇 회분을 접종해야 하나요?

귀하의 나이에 따라 투여 받는 COVID-19 백신의 기본 접종 횟수가 다릅니다.

#### 기본 접종

- 화이자 또는 모더나 백신으로 기본 접종을 받는 경우, 3회 접종 받아야 합니다
- 노바백스 백신으로 기본 접종을 받는 경우, 2회 접종을 받아야 합니다
- 존슨앤드존슨(J&J) 백신으로 기본 접종을 받은 경우, J&J 백신 1회 + 화이자나 모더나 백신 중 선택하여 1회 접종을 받아야 합니다

#### 개량된 추가접종(부스터)

과거에 받은 부스터 접종의 횟수와 백신 유형과 상관없이, 생후 6개월 이상인 모든 사람은 개량된(2가 백신) 추가접종을 받도록 권장합니다. 단, 예외 되는 경우: 이미 화이자 백신으로 기본 접종을 마친 생후 6개월에서 만 4세 사이의 어린이는 현재 추가접종을 받을 수 있는 대상이 아닙니다. 자세한 내용은 [추가접종](#)을 참고하시기 바랍니다.

\*만 18세 이상일 경우 mRNA (화이자 또는 모더나) ‘2가 백신’ 부스터 접종 대신에 노바백스(단가 백신)를 투여 받을 수 있습니다. mRNA 부스터를 받을 수 없거나 받을 의향이 없고 그리고 이전에 COVID-19 부스터를 한번도 접종 받은 적이 없는 경우 투여 받을 수 있습니다.

귀하 (또는 귀하 자녀)가 언제 접종을 받을 수 있는지에 대해 알아보려면 CDC [부스터 접종을 포함하여 최신 COVID-19 백신 권장 접종](#) 웹페이지에서 상호작용 툴을 이용하여 부스터 접종 일정 알아보기를 확인하십시오.

현재 귀하의 치료 계획에 따라서 담당 의사에게 백신 접종의 최적 시기에 대해 상의하시길 바랍니다. 이 점은 면역 억제 요법을 시작 혹은 재개할 예정이라면 특히 중요합니다.

면역 부전자에게 권장되는 모든 기본 접종 및 추가접종(부스터)에 대한 정보는 [ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules](http://ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules)와 DPH [COVID-19 백신 접종 일정표](#)에서 확인하시길 바랍니다.

### 자신을 스스로 보호하기 위해 추가로 다른 어떤 조치를 취해야 하나요?

COVID-19 백신 접종 외에도 COVID-19로부터 자신을 보호하기 위해 추가로 다음과 같은 조치를 취하는 것이 중요합니다.

- **고기능 보호 마스크를 착용하십시오.** 더욱 강력한 보호 효과를 위해 얼굴에 편안하게 맞는 호흡용 보호구 (예: N95, KN95, KF94) 또는 [이중 마스크](#)를 착용하십시오. 가급적이면 사람이 많이 모이는 실내 공간 또는 공기 순환이 원활하지 않은 공간은 피하십시오. 자세한 내용은 [ph.lacounty.gov/reducerrisk](http://ph.lacounty.gov/reducerrisk) 및 [ph.lacounty.gov/masks](http://ph.lacounty.gov/masks)를 확인하십시오.





# COVID-19 백신 - 자주 묻는 질문 (FAQ)

## 면역력 저하된 사람

- 귀하와 시간을 보내는 사람들에게 확산 예방을 위하여 돕도록 권장하십시오. 추가접종을 포함하여 COVID-19 [최신 권장 백신까지](#) 접종하고, COVID-19 에 감염되거나 귀하에게 전염될 수 있는 [위험도를 줄이기 위한](#) 다른 조치를 실천해야 합니다.

몸이 아프기 시작할 경우, 서둘러 **COVID-19** 검사를 수행하고, 무료로 **COVID-19** 치료를 받으십시오. COVID-19 에 감염된 경우 중증화로 이어지지 않도록 막을 수 있는 약품이 있습니다. 귀하의 증상이 경미하고 과거에 이부실드를 복용하였어도, 담당 의사에게 즉시 치료를 받으십시오. 의약품은 증상이 발현하고 즉시 복용해야 효과가 좋습니다. 지체하지 마십시오. COVID-19 약품을 무료로 받을 수 있는 방법에 대한 자세한 정보는 [ph.lacounty.gov/covidmedicines](http://ph.lacounty.gov/covidmedicines) 를 방문하여 확인하십시오.

### 더 많은 정보는 어디서 볼 수 있나요?



- 이 자주 묻는 질문 또는 다른 COVID-19 백신 관련 주제에 관한 자주 묻는 질문을 인쇄하거나 보려면, QR 코드를 스캔 또는 [COVID-19 백신 자주 묻는 질문](#) 웹페이지를 방문하십시오.
- [VaccinateLACounty.com](http://VaccinateLACounty.com) - 그래픽 자료로 각 백신의 접종 시기를 알 수 있는 [COVID-19 백신 접종 일정 및 백신 접종 방법](#)에 대한 정보 포함됨.
- 자세한 내용은 [중등증 또는 위중증 면역 저하자를 위한 COVID-19 백신 정보](#)를 설명하는 CDC 웹페이지를 방문하여 확인하십시오.
- 문의 사항이 있다면 담당 의사와 상담하십시오.

