



COVID-19 疫苗 – 常见问题解答 (FAQ)

适用于免疫功能受损者



为什么给免疫系统薄弱者的疫苗接种建议不一样？

免疫系统中度或严重受损者（如患有与血液相关的癌症或正在接受特定的癌症治疗，接受了器官移植，患有某些自身免疫性疾病的个人）尤其容易受到 COVID-19 的侵害。他们比免疫系统正常者更容易感染 COVID-19。如果感染了 COVID-19，他们更有可能病得很重，并将病毒传播给其他人。

一些免疫系统薄弱的人对 COVID-19 疫苗的反应不如免疫系统正常的人。他们需要接种更多剂量才能获得最好的保护。

我应该接种多少剂疫苗？

这取决于你的年龄和你接种的初始系列疫苗。

初始系列疫苗

- 辉瑞(Pfizer)或莫德纳(Moderna)初始系列疫苗是三剂。
- 诺瓦瓦克斯(Novavax)初始系列疫苗是两剂。
- 强生(J&J)初始系列疫苗包括一剂强生疫苗再加一剂辉瑞或莫德纳疫苗。

加强剂疫苗

建议所有 6 个月及以上的个人接种一剂更新版（二价）加强剂*，无论过去接种了多少剂加强剂。例外情况是：接种了辉瑞初始系列疫苗的 6 个月至 4 岁儿童目前没有资格接种加强剂。请参阅“[加强剂](#)”了解更多信息。

*年满 18 岁的个人如果不能或不愿接种 mRNA 加强剂，并且之前从未接种过 COVID-19 加强剂疫苗，就可以选择接种一剂诺瓦瓦克斯（单价）疫苗，以代替 mRNA（辉瑞或莫德纳）二价加强剂。

请访问美国疾病控制与预防中心(CDC)的“[保持最新的 COVID-19 疫苗接种状态（包括加强剂）](#)”网页，使用上面的“了解何时接种加强剂”工具，了解你（或你的孩子）何时应该接种 COVID-19 疫苗。

向你的医生询问根据你目前的治疗计划，接种疫苗剂量的最佳时机。如果你即将开始或重新开始免疫抑制治疗，这一点尤为重要。

请参阅公共卫生局网页 ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules 上的 [COVID-19 疫苗接种时间表](#)，了解所有建议免疫功能受损者接种的初始系列和加强剂量疫苗。

我还应该采取哪些措施来保护自己？

除了接种 COVID-19 疫苗外，采取其他措施保护自己免于感染 COVID-19 也很重要：



COVID-19 疫苗 – 常见问题解答 (FAQ)

适用于免疫功能受损者

- 佩戴具有防护性的口罩，例如贴合面部的呼吸器（如 N95、KN95、KF94）或佩戴双层口罩，以加强防护效果。尽量避免前往人群拥挤的室内区域或空气流通不畅的地点。欲了解更多详情，请参阅 ph.lacounty.gov/reducerisk 和 ph.lacounty.gov/masks。
- 鼓励和你在一起的人帮助保护你的健康。他们应该保持最新的 COVID-19 疫苗接种状态，包括接种更新版加强剂，并采取其他措施减少他们感染和传播 COVID-19 给你的风险。

如果你开始感觉不适，请迅速采取行动进行 COVID-19 检测和获得免费的 COVID-19 治疗。如果你感染了 COVID-19，可以使用药物来帮助降低患病的风险。即使你的症状轻微，，请立即向你的医生寻求治疗。在症状出现后不久用药的效果最佳，所以不要拖延。请参阅 ph.lacounty.gov/covidmedicines 了解更多资讯，包括如何获取免费的 COVID-19 药物。

我在哪里可以获得更多的信息？



- 如需打印或查看本常见问题解答或其他关于 COVID-19 疫苗主题的常见问题解答，请扫描二维码或访问 [COVID-19 疫苗常见问题解答 \(FAQ\)](#)。
- [VaccinateLACounty.com](https://vaccinate.lacounty.com) – 包括 [COVID-19 疫苗接种时间表](#)，其中有图表显示应接种每一剂疫苗的时间，以及 [如何接种疫苗](#) 的信息。
- 欲了解更多信息，请参阅美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的网页：“[适用于中度或重度免疫功能受损者的 COVID-19 疫苗](#)”。
- 如果你有任何问题，请咨询你的医生。