



COVID-19 疫苗 – 常見問題解答 (FAQ)

適用於免疫功能受損者



為什麼給免疫系統薄弱者的疫苗接種建議不一樣？

免疫系統中度或嚴重受損者（如患有與血液相關的癌症或正在接受特定的癌症治療，接受了器官移植，患有某些自身免疫性疾病的個人）尤其容易受到COVID-19的侵害。他們比免疫系統正常者更容易感染COVID-19。如果感染了COVID-19，他們更有可能病得很重，並將病毒傳播給其他人。

一些免疫系統薄弱的個人對COVID-19疫苗的反應不如免疫系統正常的人。他們需要接種更多劑量才能獲得最好的保護。

我應該接種多少劑疫苗？

這取決於你的年齡和你接種的初始系列疫苗。

初始系列疫苗

- 輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)初始系列疫苗是三劑。
- 諾瓦瓦克斯(Novavax)初始系列疫苗是兩劑。
- 強生(J&J)初始系列疫苗包括一劑強生疫苗再加一劑輝瑞或莫德納疫苗。

加強劑疫苗

建議所有6個月及以上的個人接種一劑更新版（二價）加強劑*，無論過去接種了多少劑加強劑。例外情況是：接種了輝瑞初始系列疫苗的6個月至4歲兒童目前沒有資格接種加強劑。請參閱「[加強劑](#)」瞭解更多資訊。

*年滿 18 歲的個人如果不能或不願接種 mRNA 加強劑，並且之前從未接種過 COVID-19 加強劑疫苗，就可以選擇接種一劑諾瓦瓦克斯（單價）疫苗，以代替 mRNA（輝瑞或莫德納）二價加強劑。

請訪問美國疾病控制與預防中心(CDC)的「[保持最新的COVID-19疫苗接種狀態（包括加強劑）](#)」網頁，使用上面的「瞭解何時接種加強劑」工具，瞭解你（或你的孩子）何時應該接種COVID-19疫苗。

向你的醫生詢問根據你目前的治療計劃，接種疫苗劑量的最佳時機。如果你即將開始或重新開始免疫抑制治療，這一點尤為重要。

請參閱公共衛生局網頁 ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules 上的 [COVID-19疫苗接種時間表](#)，瞭解所有建議免疫功能受損者接種的初始系列和加強劑量疫苗。

我還應該採取哪些措施來保護自己？

除了接種COVID-19疫苗外，採取其他措施保護自己免於感染COVID-19也很重要：

- 諮詢你的醫生，瞭解有關預防COVID-19的藥物。目前，一種名為Evusheld的藥物可幫助讓僅靠接種疫苗無法建立足夠保護力的個人預防COVID-19感染。給藥方式是一次進行兩針臀部注射。年滿12歲且體重至少為88磅的個人每六個月注射一次。請諮詢你的醫生相關風險



COVID-19 疫苗 – 常見問題解答 (FAQ)

適用於免疫功能受損者

和益處，以及這種藥物是否適合你。有關更多資訊，請參閱美國食品藥物管理局 (FDA) 提供給患者/父母的 [Evusheld 資料便覽](#)。

- 佩戴具有防護性的口罩，例如貼合面部的呼吸器（如N95、KN95、KF94）或佩戴 [雙層口罩](#)，以加強防護效果。盡量避免前往人群擁擠的室內區域或空氣流通不暢的地點。欲瞭解更多詳情，請參閱 ph.lacounty.gov/reducerisk 和 ph.lacounty.gov/masks。
- 鼓勵和你在一起的人幫助保護你的健康。他們應該 [保持最新的](#) COVID-19 疫苗接種狀態，包括接種更新版加強劑，並採取其他措施減少他們感染和傳播 COVID-19 給你的 [風險](#)。

如果你開始感覺不適，請迅速採取行動進行 COVID-19 檢測和獲得免費的 COVID-19 治療。如果你感染了 COVID-19，可以使用藥物來幫助降低患病的風險。即使你的症狀輕微，並且即使你獲得了 Evusheld，請立即向你的醫生尋求治療。在症狀出現後不久用藥的效果最佳，所以不要拖延。請參閱 ph.lacounty.gov/covidmedicines 瞭解更多資訊，包括如何獲取免費的 COVID-19 藥物。

我在哪裡可以獲得更多的資訊？



- 如需列印或查看本常見問題解答或其他關於 COVID-19 疫苗主題的常見問題解答，請掃描 QR 碼或訪問 [COVID-19 疫苗常見問題解答 \(FAQ\)](#)。
- VaccinateLACounty.com – 包括 [COVID-19 疫苗接種時間表](#)，其中有圖表顯示應接種每一劑疫苗的時間，以及 [如何接種疫苗](#) 的資訊。
- 欲瞭解更多資訊，請參閱美國疾病控制與預防中心 (CDC) 的網頁：「[適用於中度或重度免疫功能受損者的 COVID-19 疫苗](#)」。
- 如果你有任何問題，請諮詢你的醫生。

