



생후 6개월 이상의 어린이 대상 COVID-19 백신 학부모 및 보호자를 위한 자주 묻는 질문 (FAQ)



백신은 항상 무료입니다. 귀하와 자녀에게 체류 신분 여부에 대해 질문하지 않을 것입니다.
가까운 곳에 있는 접종소를 찾으려면 VaccinateLACounty.com 또는 VacunateLosAngeles.com
(스페인어)를 방문하십시오.

제 자녀가 COVID-19 백신을 접종해야 하는 이유는 무엇인가요?

백신 접종을 받는 것이 자녀가 COVID-19에 감염되지 않도록 보호 받는 최선의 방법입니다. 또한 COVID-19로 인해 유발되는 장기적인 건강 문제로부터 보호를 해줍니다.

어린이는 COVID-19 증상이 경미하게 나타나지만 어린이도 심하게 앓을 수 있습니다. 지금까지 미국에서 1,900명의 어린이가 **사망**했습니다. 처음에 가벼운 증상이 있던 일부 어린이가 몇 주 후에 소아·청소년 다기관 염증증후군(MIS-C)으로 발전한 경우도 있습니다. MIS-C는 심장, 폐, 신장, 뇌, 피부, 눈, 위장 기관 등 다양한 신체 부위에 염증이 생기는 질병입니다.

또한, 감염된 성인과 마찬가지로 증상이 경미하더라도 일부 어린이도 포스트 코비드 컨디션(post-COVID-19 condition) 또는 ‘롱 코비드’를 겪기도 합니다. 롱 코비드에 걸린 어린이는 피로감, 두통 및 집중력 저하를 경험할 수 있습니다. 이는 COVID-19 감염 후 몇 주 또는 몇 달 동안 지속될 수 있습니다. 최근 연구에 따르면 ‘롱 코비드’는 백신을 접종하지 않은 어린이에게서 더 흔히 나타나는 것으로 밝혀졌습니다.

질병이 없는 건강한 어린이도 입원할 수 있으며 정신 건강과 신체 건강, 삶의 질에 영향을 미칠 수 있는 장기 합병증도 겪을 수 있습니다. 추가접종을 포함하여 권장하는 **최신** COVID-19 백신 접종을 받는 것이 이런 부작용의 위험을 줄일 수 있습니다.

어떤 백신을 언제 맞아야 할까요?

제 아이는 어떤 종류의 COVID-19 백신(들)을 접종받을 수 있나요?

COVID-19 백신은 생후 6개월 이상이면 모두에게 접종을 권장합니다. 접종 연령대에 맞게 허가된 백신은 다음과 같습니다.

- 자녀가 생후 6개월 이상인 경우, 화이자 또는 모더나 백신을 접종 가능
- 자녀가 만 12세 이상이면 노바백스 백신을 접종 가능

접종 용량은 접종 시 어린이의 나이를 기반으로 하며 어린이의 키 또는 몸무게가 기준이 되지 않습니다. 올바른 면역 반응을 형성하는 데 필요한 접종 용량입니다. 만 12세 이상의 어린이는 청소년과 성인과 동일한 접종 용량을 투여 받을 수 있습니다.

접종 횟수 및 백신 접종 간격은 어린이가 백신 접종 받은 날짜, 나이 및 **면역 저하** 여부에 따라 다릅니다.

웹사이트 ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules에서 어린이 대상 백신의 권장사항에 대해 자세히 알아보십시오. 각각의 백신에 대한 정보는 **화이자** 또는 **모더나** 또는 **노바백스** 접종자 및 보호자를 위한 FDA 자료표를 확인하십시오. 질문이 있는 경우 담당 의사와 상의하십시오.





접종 일정에 따르면 2차 접종은 1차 접종 후, 8주 뒤에 또 받아야 합니다. 제 자녀가 백신 2차 접종을 언제 받아야 하는지 어떻게 결정하나요?

권장하는 자녀의 2차 COVID-19 기본 접종의 시기는 자녀 개인 사정에 따라 다를 수 있습니다.

- 중등증 또는 중증 면역 체계 악화 아동의 경우 1차 접종 3주 뒤(화이자 및 노바백스) 또는 4주 뒤(모더나)에 2차 접종받는 것이 권장됩니다. 충분한 보호력을 최대한 신속하게 보호를 받아야 할 때(지역사회 내 COVID-19 전파 수준이 높을 때 또는 개인이 중증 질환에 걸릴 위험이 더 높을 때) 접종 받는 것도 권장됩니다.
- 일부 아동, 특히 남성 청년들(만 12-39세)에게는 1차 접종을 하고 8주 뒤에 가장 좋을 수 있습니다. 1차와 2차 접종 사이의 시간이 길면 백신의 효능이 향상될 수 있기 때문입니다. 게다가, 이는 드물게 발생하는 심근염 및 심낭염(심장질환)의 위험을 낮춰줄 수 있습니다.

기존 (단가) COVID-19 백신과 개량 (2가 백신) 백신은 어떻게 다른가요?

단가 백신은 COVID-19를 유발하는 원종 바이러스를 표적 대응하기 위한 백신입니다. 이 백신은 기존 COVID-19 바이러스와 BA.4, 및 BA.5 오미크론 변이에 모두 대항하기 위해 개량된 백신입니다..

- **기본접종-** 단가 백신은 한가지 예외를 제외하고 모든 백신의 기본 접종으로 사용됩니다. 2가 백신은 생후 6개월에서 만 4세 사이의 어린이를 위한 화이자의 3차 기본 백신으로 접종 받을 수 있습니다.
- **추가접종-** 모든 화이자 및 모더나 추가접종은 ‘2가 백신’ (개량)입니다. 노바백스 추가접종은 단가 백신입니다

제 자녀는 COVID-19 부스터 접종의 대상인가요?

네. 개량 (2가 백신) 부스터는 생후 6개월 이상이면 모든 사람에게 접종을 권장합니다. 화이자의 기본 접종을 마친 생후 6개월에서 만 4세 사이의 어린이는 현재 부스터 접종의 대상이 아닙니다.

개량된 추가접종은 시간이 지남에 따라 줄어드는 COVID-19에 대한 보호력을 증강시킬 수 있고 새 변이에 대한 광범위한 보호 효과를 제공합니다. 기존 (단가) 화이자 및 모더나 부스터 접종은 더 이상 사용하지 않습니다.

개량된 추가 1회 접종은 마지막 COVID-19 백신 접종 (마지막 기본 접종 또는 마지막 기존 [단가] 부스터 중 하나)를 마친 후, 최소 2개월 뒤에 권장됩니다. 이것은 과거에 투여 받은 기존(단가) 부스터의 횟수와 투여 받은 백신(들) 종류와 상관없이 가능합니다. 만 11세 이하 어린이는 십대 또는 성인 보다 적은 용량의 백신을 받습니다.

만 5세 이상인 모든 사람

- 모더나 기본 접종을 완료한 만 5세 어린이는 화이자 또는 모더나 개량된 추가접종을 받을 수 있습니다
- 화이자 백신의 기본 접종을 마친 만 5세 어린이는 화이자의 개량된 추가접종을 받을 수 있습니다.





생후 6개월 이상의 어린이 대상 COVID-19 백신 학부모 및 보호자를 위한 자주 묻는 질문 (FAQ)

- 생후 6개월 이상은 화이자 또는 모더나의 개량된 추가접종을 받을 수 있습니다.

생후 6개월-만 4세 사이의 어린이

- 모더나 백신의 기본 접종을 완료한 어린이는 모더나 개량된 추가접종을 받을 수 있습니다
- 화이자 백신의 기본 접종을 완료한 어린이는 현재 추가접종을 받을 대상이 아닙니다. 참고: 이 연령대를 위한 화이자 기본 접종은 현재 3차 접종의 '2가 백신 (개량) 백신을 포함합니다.

CDC 상호적인 [COVID-19 부스터샷 접종](#) 툴을 이용하여 귀하의 자녀가 1차 이상의 부스터샷 접종받을 수 있는지 결정하는 데 도움을 받으십시오. 질문이 있으시면 주치의와 상의하십시오.

자녀가 COVID-19에 걸린 적이 있어도 자녀에게 백신을 접종시켜야 하나요?

물론입니다. 귀하의 자녀가 과거에 COVID-19에 감염된 적이 있어도 최신 백신의 접종을 권장합니다. 왜냐하면 백신이 추가 보호 효과를 제공해주기 때문입니다.

COVID-19에 감염되면 '자연 면역'이라고도 하는 면역 기능 덕분에 앞으로 COVID-19에 걸리지 않도록 어느 정도 보호를 제공해 줍니다. 하지만 사람마다 감염되고 제공받는 보호 수준이 다를 수 있습니다. 감염 질환의 중증도에 따라 다를 수 있고, COVID-19에 감염된 이후의 경과된 시간, 그리고 나이에 따라 다를 수 있습니다. 현재 COVID-19로부터 보호받고 있는지 확실하게 알 수 있는 검사는 없습니다. 2022년 7월에 출판된 [연구](#)에 따르면 백신 미접종자에 비해 백신을 접종 받은 사람들이 COVID-19에 감염된 경우 강한 면역반응이 생겼고 접종을 받지 않은 사람 보다 백신 접종자에게 강한 면역력이 생성되었습니다.

최근 자녀가 COVID-19에 감염되었으면, 최초로 COVID-19에 감염되고 나서 3개월을 기다렸다가 COVID-19 기본접종 또는 부스터 접종을 시작하는 것을 고려하십시오. 이것은 COVID-19에 처음 감염된 후 3개월 이내에는 재감염될 확률이 낮기 때문입니다. 감염과 백신 접종 사이의 시간이 길어지면 백신 접종에 대한 면역 반응이 좋아질 수 있기 때문입니다. 하지만 3개월 이후로 접종 시기를 너무 연기하지 않도록 해야 합니다. 귀하의 자녀가 현재 COVID-19에 감염된 경우라면, 최소한 격리 기간이 종료되고 나서 백신을 받도록 해야 합니다. 이것은 의료 종사자와 다른 직원에게 전염되지 않도록 하기 위한 것입니다.

자녀가 소아/청소년 다기관 염증 증후군(MIS-C)을 앓았다면, 회복한 후에는 백신 접종을 받기 전에 잠시 기다려야 할 수 있습니다. 담당 의사와 상담하십시오.

COVID-19 백신의 안전성

소아 청소년이 백신을 접종해도 안전한가요?

네, 아이들이 COVID-19 백신을 접종해도 안전합니다. 아이들에게 COVID-19 백신을 권장하기 전에, 수천 명의 아이들과 함께 임상시험을 시행했으며 해당 연령군의 백신 안전성과 효과성을 검증했습니다.

현재까지 만 5세에서 17세 사이의 [수천만 명의 어린이와 십대](#)가 현대까지 적어도 1회분의 COVID-19 백신을 맞았습니다. 안전 모니터링을 지속적으로 한 결과, COVID-19 백신 접종이 어린이와 십대들에게 계속 안전하다는 것을 증명합니다.





생후 6개월 이상의 어린이 대상 COVID-19 백신 학부모 및 보호자를 위한 자주 묻는 질문 (FAQ)

부작용은 가볍고 일시적이며 다른 일상적인 백신 접종 후 경험하는 것과 유사한 경향이 있습니다. 어린이에게서 COVID-19 백신 접종 후 **심각한 반응**은 드물게 나타나며 보통 백신 접종 후 며칠 이내로 발생합니다.

심근염 및 심막염

화이자 또는 모더나 COVID-19 백신을 맞은 후 심근염(심근의 염증)과 심낭염(심장의 외벽의 염증)의 드문 사례가 보고되었습니다. 대부분의 경우 백신 2차 접종 후 만 12세에서 만 39세 사이의 남성에게서 발생합니다. 첫 번째와 두 번째 접종 사이의 기간(8주)이 길어지면 이러한 희귀 질환이 나타날 위험은 감소할 수 있습니다.

2022년 9월, CDC의 최근 [연구](#)에 따르면 COVID-19 백신을 받은 생후 6개월-만 5세 사이의 어린이에게 심근염에 대한 높은 위험이 없다는 것을 밝혔습니다.

최근 만 5세 이상을 대상으로 한 [연구](#)에서 심근염과 같은 심장 합병증의 위험이 화이자 또는 모더나 백신을 투여받은 후보다 COVID-19 후 더 높다는 것이 밝혀졌습니다. 이는 남성과 여성에게서 관찰되었습니다. COVID-19 백신 접종 이후 심근염은 다른 원인으로 인해 심근염만큼 가볍고 오래 지속되지 않는다는 점도 유의해야 합니다. 백신접종 후 심근염이나 심막염이 있는 사람들은 대부분 약을 복용하고 휴식을 취한 경우 호전되었습니다.

자녀가 가슴 통증 또는 숨이 가쁘거나 심장이 빨리 뛰거나 두근거리는 느낌이 든다면 의료 도움을 구하십시오.

CDC 웹사이트의 [mRNA COVID-19 백신 접종 후 발생한 심근염 및 심낭염](#)에서 자세히 알아보십시오.

아나필락시스

아나필락시스(Anaphylaxis)는 백신 접종 후 발생할 수 있는 심각한 알레르기 반응입니다. 다른 덜 심각한 알레르기 반응도 일어날 수 있습니다. 백신 접종 후 알레르기 과민증이 발생하면 생각하면 즉시 911에 전화하십시오. CDC 웹사이트 [COVID-19 백신 접종 후 알레르기 반응](#)에서 자세히 알아보십시오.

CDC는 생후 6개월 이상의 모든 사람에게 [COVID-19 백신 접종](#)을 권장합니다. 입원, 장기 질환 및 사망을 포함한 COVID-19 질병의 위험은 이미 확인되었으며, 이 위험성은 백신 접종으로 드물게 발생하는 이상 반응을 일으킬 잠재적 위험성보다 더욱 큽니다.

어린이의 백신 부작용에는 어떠한 것이 있나요?

어린이가 겪는 COVID-19 접종 이후 부작용은 성인에게서 나타나는 부작용과 유사합니다. 소아가 겪는 부작용은 일상적인 백신 접종 이후 경험하는 부작용과 유사하며 2차 접종 이후에 더 흔하게 발생합니다. 부작용은 기본 접종의 부작용과 비슷하거나 경미하게 나타납니다.

흔한 부작용은 통증, 부기, 백신을 접종받은 팔 또는 허벅지 부위 발적, 근육통 또는 관절통, 림프절 부종, 발열, 오한, 두통, 과민 또는 울음, 피로감, 졸림, 식욕 부진 등을 포함될 수 있습니다.

이러한 부작용으로 인해 일상 활동에 일부 제한을 줄 수 있지만, 며칠 내로 부작용이 사라질 것입니다. 모든 사람이 부작용을 겪는 것은 아닙니다. 부작용은 정상적이며 신체에서 면역력을 키우고 있다는 징후입니다.





자녀가 COVID-19 백신 접종으로 COVID-19에 걸릴 수 있나요?

아닙니다. 자녀가 백신 접종으로 COVID-19에 감염될 수는 없습니다. 그것은 불가능합니다. 미국에서 사용되는 백신에는 COVID-19를 유발하는 바이러스가 어떤 형태로도 포함되어 있지 않습니다.

자녀가 COVID-19과 다른 백신을 한꺼번에 같이 맞아도 괜찮은가요?

네. 생후 6개월 이상 어린이는 독감, MMR(홍역, 유행성 이하선염, 풍진), Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해/백일해)과 같은 다른 백신과 동시에 COVID-19 백신을 맞을 수 있습니다. 자녀가 필요한 다른 백신을 제공하지 않는 곳에서 COVID-19 백신을 맞으면 언제든지 다른 곳으로 가서 접종할 수 있습니다. 백신 접종 사이에 기다릴 필요가 없습니다.

알레르기가 있는 아이가 화이자 또는 모더나 COVID-19 백신을 맞아도 되나요?

경우에 따라 다릅니다.

- 경구약, 음식(계란 포함), 라텍스, 반려견 또는 꽃가루와 같은 것에 알레르기가 있는 어린이 또는 알레르기의 가족력이 있는 사람들이 백신을 맞을 수 있습니다. 백신에는 음식 단백질(계란이나 견과류 제품), 젤라틴, 라텍스, 항생제, 금속 또는 방부제(티메로살이나 수은)가 들어 있지 않습니다. [여기서](#) 화이자 COVID-19 백신에 없는 성분이 무엇인지 자세히 알아보십시오.
- 자녀가 백신이나 주사 가능한 치료법에 대해 알레르기 반응을 보인 경우(증상이 심하지 않더라도) 의사와 상담하십시오. 의사는 백신을 접종하는 것이 안전한지 결정하는 것을 도와줄 것입니다.
- 폴리에틸렌 글리콜(PEG)에 알레르기가 있는 어린이들은 화이자 또는 모더나 백신을 맞지 말아야 합니다.

알레르기에 대한 정보가 변경될 수 있습니다. 최신 지침을 보려면 CDC 웹 페이지 [COVID-19 백신 감염 및 COVID-19 백신 접종 후 알레르기 반응](#)을 참고하시고 의사와 상의하십시오.

백신이 불임을 유발합니까?

아니요, 백신은 불임을 유발하지 않습니다. COVID-19 백신을 포함한 그 어떠한 백신도 여성 또는 남성 불임 문제를 일으킨다는 증거가 없습니다. 게다가 mRNA를 포함한 백신 성분이나 COVID-19 백신 접종 후 만들어진 항체가 (현재나 미래에) 임신을 하는데 문제를 일으킬 것이라는 증거는 없습니다. 연구에 따르면 여성과 남성 모두에서 백신 접종자와 백신 미접종자 사이의 임신율에는 차이가 없는 것이 확인되었습니다. 백신은 사람의 DNA를 변경시키지 않습니다. 또한, COVID-19 백신이 청소년 또는 십 대의 발달에 영향을 미친다는 증거도 없습니다. 자세한 내용은 CDC 웹페이지의 [임신 계획이 있는 사람을 위한 COVID-19 백신](#)을 참고하십시오.

COVID-19 백신이 자녀의 생리에 영향을 미칠 수 있나요?

일부 사람은 백신을 접종한 후 생리가 늦어지고, 생리 양이 많아졌으며, 생리통이 심해지는 등 생리에 변화가 있었다고 보고했습니다. 최근의 두 [연구](#)는 COVID-19 백신 접종 후 작지만 흔한 인체의 변화를 다루었습니다. 이러한 변화는 평소보다 심한 출혈뿐만 아니라 생리 주기의 길이와 주기 사이의 시간의 변화 등이 있었습니다. 이러한 현상은 일시적이었습니다.

생리 주기에 영향을 주는 요인이 많음을 기억하는 것이 중요합니다. 여기에는 스트레스와 수면, 식이요법, 운동, 일부 의약품과 같이 여러 요인이 포함됩니다. 불규칙한 생리는 십 대에 매우 흔하게





생후 6개월 이상의 어린이 대상 COVID-19 백신

학부모 및 보호자를 위한 자주 묻는 질문 (FAQ)

나타나며, 특별한 원인 없이 발생할 수 있습니다. 자녀가 생리로 걱정하고 있으면, 담당 의사에게 문의하는 것을 권장해 드립니다.

COVID-19 백신은 자녀에게 장기적인 부작용을 일으킬 수 있나요?

아니요. 수백억명의 사람들이 COVID-19 백신을 접종 받고 예상 이외의 장기적인 부작용을 경험하지 않았습니다. 이미 밝혀진 정보에 따르면, 모든 희귀 부작용은 일반적으로 백신 접종 후 6주 이내에 나타나기 시작합니다. 이러한 이유로 미국 식품의약국(FDA)은 백신 승인을 위한 임상 시험에서 각 백신의 마지막 접종 후 최소 8주 동안 연구할 것을 요구했습니다. 또한, CDC는 백신의 승인 후에도 COVID-19 백신의 모니터링을 계속하고 있습니다.

이와 대조적으로 COVID-19 유발 바이러스가 어린이들에게 몇 가지 장기적인 영향을 미칠 수 있다는 것을 알고 있습니다. 예를 들어, **롱 코비드**라고 불리는 초기 감염 후 몇 달 동안 피로감, 수면 장애, 두통, 호흡 곤란과 같은 증상을 호소하는 사람들이 있습니다. 또한 **다기관 염증 증후군(MIS-C)**이라 불리는 심각한 질병을 일으킬 수 있습니다. 심장, 폐, 신장, 뇌, 피부, 눈, 위장 기관과 같은 다른 신체 부위에 염증이 있는 COVID-19와 관련된 희귀하지만 심각한 질병입니다. 많은 환자들이 입원을 하고 불행하지만 사망에 이를 수도 있습니다. COVID-19 백신은 바이러스에 의한 ‘장기적인’ 부작용에서 보호를 해줍니다. CDC [COVID-19 백신의 안전성](#) 웹페이지를 방문하여 자세한 내용을 보실 수 있습니다.

백신 접종 후 자녀에게 부작용(부작용 가능성)이 나타나면 어떻게 보고해야 하나?

자녀가 백신을 접종한 후 부작용이 있으면, 담당 의사와 상담하고 백신 부작용 보고 시스템 (또는 VAERS)에 백신의 부작용을 보고하십시오. 백신이 부작용의 원인인지 확실하지 않더라도 일단 신고하십시오. VAERS는 FDA와 CDC가 가능한 모든 안전성 문제를 파악하기 위해 사용하는 조기 경보 시스템입니다. 보고를 하려면 1-800-822-7967로 전화하거나 <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>을 방문하십시오.

스마트 폰이 있으면 [v-safe](#)에 등록하여 CDC가 백신을 모니터링하도록 도울 수 있습니다. **V-safe**는 백신 접종 후 자녀의 상태를 확인하기 위해 문자 메시지를 보내는 스마트 폰 기반 도구입니다. 각 어린이는 별도로 가입해야 합니다. 모든 v-safe 문자 메시지는 부모님이나 보호자의 스마트 폰으로 직접 전송됩니다.

VAERS와 v-safe 모두 의료 조언을 제공하지 않습니다. COVID-19 백신 접종 이후 자녀에게 우려되는 증상이나 건강상 문제가 있는 경우 담당 의사에게 전화하거나 의료 도움을 받으십시오.

아이들 COVID-19 백신 접종하기

어디에서 접종을 받을 수 있나요?

백신은 LA 카운티 전역의 수백 곳에서 이용할 수 있습니다. 위치에는 소아과 의사 사무실, 클리닉, 약국, 학교, COVID-19 특별 백신 접종 장소 및 임시 접종소가 포함됩니다. 많은 장소에서 사전 예약이 필요하지 않습니다.

집에 머물러야만 하는 사람들을 위해 가정 방문 백신접종도 가능합니다.

자세한 정보는 VaccinateLACounty.com를 방문하십시오. 833-540-0473으로 백신 콜 센터에 전화하실 수도 있습니다. 매일 오전 8시부터 오후 8시 30분까지 운영되며 백신 접종 장소까지 무료 교통편도





생후 6개월 이상의 어린이 대상 COVID-19 백신 학부모 및 보호자를 위한 자주 묻는 질문 (FAQ)

연결해줍니다. 자녀의 연령에 적합한 화이자 백신을 제공하는 위치를 선택하는 것을 유의하십시오.

COVID-19 백신은 무료인가요?

네, COVID-19 백신은 생후 6개월 이상 모든 사람이 무료로 이용할 수 있습니다. COVID-19 백신은 보험이나 이민 신분과 관계없이 미국에 거주하는 모든 적격자에게 계속 제공됩니다. 백신 접종 사이트에서 귀하의 건강 보험증을 확인하도록 요청할 수 있지만, 귀하의 자녀가 백신을 받을 필요는 없습니다.

제 자녀의 디지털 백신 기록을 받을 수 있나요?

자녀가 캘리포니아에서 백신접종을 받은 경우 흰색 백신 기록 카드를 발급받으며 myvaccinerecord.cdph.ca.gov에서 디지털 COVID-19 예방접종 기록을 요청할 수 있습니다. 이것은 공식 기록입니다. 안드로이드 폰의 구글 페이(Google Pay) 또는 아이폰의 애플 헬스(Apple Health) 앱에 다운로드할 수 있습니다. 백신접종을 받았을 때 같은 이메일 주소나 휴대폰 번호를 사용했다라도 가족 한 사람당 기록을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 [백신 접종 기록 웹페이지](#)를 참조하십시오.

아이가 백신접종을 받으려면 부모의 허락이 필요한가요?

만 18 세 미만의 청소년은 백신접종을 받기 위해 부모/보호자 또는 보호자의 동의가 필요합니다. 참석할 수 없는 경우 전화, 동영상 또는 서면으로 동의를 할 수 있습니다. 귀하가 방문하려는 곳의 동의 요구 사항을 확인하세요. 공중 보건소에 의해 운영되는 장소인 경우, ph.lacounty.gov/vaccineappointment 에서 요구 사항을 확인하고 동의서를 다운로드 받을 수 있습니다 - '찾아가는 방법'을 클릭하거나 1-833-540-0473 에 전화하세요 (매일 오전 8 시 - 오후 8 시 30 분 운영).

일부 예외가 적용됩니다. 만 15 세 이상의 미성년자(예: 해방된 또는 자급자족 미성년자, 기혼자 또는 과거 기혼자)는 본인이 동의할 수 있습니다. 위탁 보호자, 친척 보호자 또는 단기 거주 치료 프로그램(ST RTP) 직원인 경우 위탁 자녀가 동의하면 동의를 제공할 수 있습니다. 만약 여러분이 수양 보호자이고 여러분이 동의를 하지 않지만 여러분의 위탁가정 자녀가 백신을 맞기를 원한다면, 그들은 법률 고문에게 연락할 수 있습니다.

아이가 백신을 접종하려 갈 때 어떤 서류가 필요한가요?

일부 백신접종 장소는 사진이 부착된 신분증이 필요할 수 있습니다. 만약 귀하가 위탁 양육 아동의 보호자이고 귀하의 위탁 자녀가 사진이 부착된 신분증을 가지고 있지 않다면, 법률 고문에게 연락하도록 하세요. 또 다른 방법은 사진이 부착된 신분증이 필요 없는 로스앤젤레스 카운티 공중 보건부에서 운영하는 접종 장소를 이용하는 것입니다.

동시에 대한 자세한 내용은 위 항목을 참조하십시오. 방문하려는 접종 장소의 요구 사항을 확인하세요. 웹페이지나 예약 확인 이메일 또는 문자 메시지를 검토하세요. LA 카운티 공중 보건부 백신 웹사이트의 요구 사항에 대한 자세한 내용은 ph.lacounty.gov/vaccineappointment 을 방문하거나 '찾아가는 방법'을 클릭하거나 1-833-540-0473(매일 오전 8시- 오후 8시 30분 운영)으로 백신 콜센터에 전화하십시오.

COVID-19 백신에 대하여 자녀와 어떤 이야기를 나눠야 할까요?

청소년들이 COVID-19 백신에 관한 사실을 아는 것은 중요합니다. COVID-19과 백신에 관련하여 인터넷과 소셜미디어 상에 잘못된 정보가 많습니다. 10대 자녀와 COVID-19에 관해 이야기를 나누고 자녀가 궁금해하는 모든 질문에 대답해 주셔야 합니다.





생후 6개월 이상의 어린이 대상 COVID-19 백신

학부모 및 보호자를 위한 자주 묻는 질문 (FAQ)

COVID-19이 유발하는 건강상의 위험과 백신이 자신을 보호하는 데 어떤 도움이 되는지 알려주십시오. 백신은 안전하고, 백신에는 코로나바이러스가 함유되어 있지 않다고 설명해 주십시오. 자녀와 함께 부작용을 살펴보고, 이런 부작용은 정상적인 반응임을 설명해 주십시오.

백신 접종에 대한 두려움을 느낀다면 안심시켜주십시오. 솔직하고 차분하게 소통하십시오. 시간을 갖고 예상되는 사항에 대해 설명하십시오. 간단히 말해서, 살짝 꼬집히는 느낌이 들 수 있지만 금방 사라진다는 점을 아이에게 얘기해주세요. ‘통증’ 또는 ‘주사’라는 단어 대신에 ‘압력’ 또는 ‘찌르기’와 같은 용어를 이용하십시오. 아이가 귀하의 말을 이해할 수 없더라도, 차분한 목소리는 아이를 안심시켜줄 것입니다. 접종 전, 접종 도중, 특히 접종 이후에 낙천적이고 편안한 자세를 유지하십시오.

귀하의 자녀가 주사 바늘을 무서워한다면 CDC 웹페이지 [바늘에 대한 두려움 및 공포증 - 공포증 대응 방법 알아보기](#)를 확인하십시오.

부모와 보호자가 자녀의 COVID-19 백신 접종을 준비하고 기록하는 것을 지원하도록 설계된 DPH 자료 "[귀하 자녀의 COVID-19 백신 소책자](#)"를 이용하십시오.

제 자녀의 COVID-19 백신 접종소를 방문하기 전에 무엇을 준비해야 되나요?

COVID-19 백신은 일상적인 백신 접종과 매우 유사한 경향이 있습니다. 아래의 조언을 확인하시면 COVID-19 백신 접종 시 귀하와 귀하의 자녀에게 도움이 될 수 있습니다.

방문 전에

- 자녀가 접종받을 수 있는 적절한 백신 접종소를 찾으십시오.
 - 해당 백신 접종소에서 귀하 자녀의 연령군 대상으로 백신을 접종해줄 수 있는지 확인해보십시오. 많은 약국에서 만 3세 미만의 소아에게 백신을 접종해줄 수 없다는 점을 유의하십시오.
 - 동의서 및 문서 요건을 확인하십시오. 웹페이지 또는 예약 확인 이메일 또는 문자에서 요건을 확인하실 수 있습니다. LA 카운티 공중 보건국 백신 접종소의 요건에 대한 자세한 정보는 ph.lacounty.gov/vaccineappointment 을 방문하십시오. ‘[찾아가는 방법](#)’을 클릭하십시오.
- 접종 예약 시 자녀에게 편의 조치가 필요한지 직원에게 알리십시오(또는 접종 예약을 할 필요가 없는 백신 접종소의 경우 접종소에 도착하여 이 사실을 알리십시오). COVID-19 백신 접종소에서 어린이가 장애인 보조 동물과 동행하는 것이 법으로 허용됩니다. [보조 교통수단 서비스](#), 백신 접종소로 이동하는 무료 대중교통 또는 [가정 방문 백신 접종](#)에 대한 자세한 정보는 ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated 를 방문하여 확인하십시오. 또한 833-540-0473 으로 DPH 백신 콜센터(운영시간: 매일 오전 8시~오후 8시 30분)에 문의할 수 있습니다. 자세한 정보는 CDC 웹페이지 [장애 아동 및 심대를 위한 COVID-19 백신 접종](#)에서 확인할 수 있습니다.
- 예약 확인서에 있는 백신에 대한 정보를 읽으십시오. 질문이 있다면 질문사항을 적어주십시오.
- 잠재적인 부작용과 부작용 관리 방법은 공중 보건국 [COVID-19 백신 부작용](#) 웹페이지에서 자세히 알아보십시오.
- 자녀와 함께 예상되는지 것을 얘기하십시오. 위의 [COVID-19 백신에 대해 자녀와 어떤 이야기를 나눠야 할까요?](#) 섹션을 확인해보십시오.

자녀의 방문 당일





생후 6개월 이상의 어린이 대상 COVID-19 백신

학부모 및 보호자를 위한 자주 묻는 질문 (FAQ)

- 자녀가 다른 사유로 처방전 없이 살 수 있는 약물을 정기적으로 복용하는 게 아니라면 부작용을 예방하기 위한 목적으로 **백신 접종 전에 자녀에게 이러한 약(진통제 또는 항히스타민제 등)을 주지 마십시오.**
- 이전에 백신을 접종받았다면 자녀의 **COVID-19 백신 접종 기록을 가져오십시오.**
- **자녀에게 안정감을 줄 수 있는 물건을 가져오십시오.** 자녀가 가장 좋아하는 장난감, 담요 또는 책 등.
- **안면 마스크를 챙겨오십시오.** 직원, 본인, 귀하의 자녀(만 2 세 이상)를 포함한 모든 사람들은 백신 접종소에서 마스크를 착용해야 합니다.
- **간식과 물을 챙기십시오.** 더운 날에 실외접종소를 방문하는 경우, 모자를 쓰고 가벼운 옷차림으로 가십시오.
- **백신 접종 이전, 접종 도중, 접종 이후에 자녀를 도와주는 방법에 대한 팁을 확인하십시오.**
 - 일상적인 백신을 접종 받는 모든 연령의 아동을 지원하는 팁은 CDC 웹페이지 [백신 접종 이전, 접종 중, 접종 이후](#) 페이지에서 확인할 수 있습니다.
 - CDC 웹페이지 유아 [백신 접종 시 스트레스 줄이는 법](#)에서 유아 접종에 대한 정보를 확인하십시오. 여기에는 유아의 주의력을 분산시키는 방법, 모유 수유 또는 의사에게 경구 설탕 용액 요청, 통증 완화 연고 또는 쿨링 스프레이 등이 있습니다.
 - 주사에 대한 두려움을 극복하는 방법에 대한 정보는 CDC 웹페이지 [주사에 대한 두려움 및 공포증](#)을 확인하십시오.

방문 중에

- 자녀에게 있을 수도 있는 **알레르기**를 백신을 주사하는 직원에게 알려주십시오.
- **자녀에게 백신 접종 중에 앉아있거나 누워있으라고 합니다.** 아이들은 백신 접종 이후 15 분 동안 계속 앉아 있거나 누워 있어야 합니다. 이렇게 앉아 있거나 누워 있으면 실신 또는 실신으로 인한 부상을 예방하는 데 도움이 됩니다. [백신 접종 시 아이를 안는 방법](#)에 대한 조언을 알아보려면 CDC 웹페이지를 확인하십시오. 백신 접종 시 스트레스를 줄이는 데 도움이 되며 의료진도 더 쉽게 아이에게 백신 접종을 할 수 있습니다.
- **자녀의 COVID-19 백신 접종 이후 15~30 분간 백신 접종소에 머무르십시오.** 귀하의 자녀에게 중증 알레르기 반응이 발생하고 치료를 받아야 하는 경우 귀하의 자녀는 관찰 받아야 합니다.
- **자녀의 의료진에게 아스피린 외 진통제 복용에 대한 조언을 구하십시오.** 가정에서 자녀를 편하게 해주기 위해 또 어떤 조치를 취할 수 있는지 물어보십시오.
- **반드시 자녀가 COVID-19 백신 접종 기록 카드를 받도록 하십시오.** 접종 카드 및 디지털 접종 기록에 대한 자세한 내용은 공중 보건국 [백신 접종 기록](#) 웹페이지를 확인하십시오.
- **자녀의 다음 백신 차수 접종 시기를 확인하십시오.** 백신 접종 직원과 함께 최적의 2 차 접종 시기에 대해 상의해볼 수 있습니다.
- **V-safe에 가입하십시오.** V-safe는 문자 메시지 및/또는 웹 설문조사를 통해 빠르고 비밀이 보장되는 건강 체크인 서비스를 제공합니다. COVID-19 백신 접종 이후 귀하 자녀의 상태에 대한 정보를 CDC와 함께 빠르고 쉽게 공유할 수 있습니다. [V-safe 백신 접종 후 건강 검사기](#) 웹사이트에서 자세히 알아보고 vsafe.cdc.gov에서 가입하십시오.

부모와 보호자가 자녀의 COVID-19 백신 접종을 준비하고 기록하는 것을 지원하도록 설계된 DPH 자료 [‘귀하 자녀의 COVID-19 백신 소책자’](#)를 이용하십시오.

