

کووید-19 حقایق واکسن



چرا واکسن کووید-19 بزنیم؟

- واکسن از خطر ابتلا به بیماری بسیار شدید ناشی از کووید-19، بستری شدن در بیمارستان یا مرگ می‌کاهد. همچنین خطر ابتلایان به کووید طولانی را کاهش می‌دهد.
- جهت برخورداری از بهترین حفاظت، شما به **تمامی دوزهای توصیه شده** نیاز دارید. این شامل یک **تقویتی بروز شده (دو ظرفیتی)** برای تمامی افراد 6 ماه به بالا* است. اگر حداقل 2 ماه از آخرین دوز واکسن کووید-19 شما گذشته است، تقویتی بروز شده خود را دریافت کنید. این صرف نظر از تعداد دوزهای تقویتی اصلی (تک ظرفیتی) و نوع واکسن (واکسن هایی) است که در گذشته دریافت کردید. *یک دوز تقویتی برای کودکان سنین 6 ماه-4 سال که یکی از سری های اولیه فایزر را تکمیل کرده اند، مجاز نیست.



چه کسانی می‌توانند واکسن بزنند؟

هر شخص 6 ماه به بالا

- واکسن‌های کووید-19 برای همه **رایگان** هستند – حتی اگر بیمه نداشته باشید.
- درباره وضعیت مهاجرتان از شما سؤال نخواهد شد.
- واکسن‌ها برای همه افراد توصیه می‌شوند، از جمله کسانی که باردار هستند یا شیر می‌دهند و کسانی که به کووید-19 مبتلا بوده‌اند.



رایگان

Pfizer (فایزر)

سنین 6 ماهه تا 4 ساله: 3 دوز اولیه (سومین دوز یک دوز دو ظرفیتی بروز شده است)

سنین 5+ سال: 2 دوز اولیه بعلاوه یک تقویتی بروز شده فایزر یا مادرنا[^]

5[^] ساله ها فقط می‌توانند یک تقویتی فایزر دریافت کنند

Novavax (نوواوکس)

سنین 12+ سال: 2 دوز اولیه بعلاوه یک تقویتی بروز شده فایزر یا مادرنا

جهت کسب اطلاعات بیشتر، به نشانی

ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules

مراجعه نمایید.

اگر دچار نقص ایمنی هستید ممکن است به دوزهای تکمیلی نیاز داشته باشید- جهت کسب اطلاعات بیشتر با پزشک خود صحبت کنید.

در برخی شرایط، ممکن است از واکسن

Johnson & Johnson برای افراد 18+ سال استفاده شود.


کدام واکسن‌های کووید-19 توصیه می‌شوند؟

Moderna (مادرنا)

سنین 6 ماهه و بزرگتر: 2 دوز اولیه بعلاوه یک تقویتی بروز شده فایزر یا مادرنا*

*6 ماه-4 ساله فقط تقویتی مادرنا دریافت می‌کنند.

کارت مدرک واکسناسیون کووید-19			
نام خانوادگی	نام	شماره پرونده پزشکی	تاریخ
		تاریخ	نرم‌نگاه محل
واکسن	شماره محصول		
دوز اول کووید-19		---	
دوز دوم کووید-19		---	
دوز		---	






نحوه دریافت واکسن

صدها مرکز در سراسر شهرستان لس آنجلس وجود دارد - بسیاری از آنها آخر هفته‌ها و غروب باز هستند و نیازی به تعیین وقت قبلی ندارند.

برای یافتن مکانی در محله خود:

- به نشانی ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated مراجعه نمایید یا از 8 صبح تا 8:30 شب با شماره **1-833-540-0473** تماس بگیرید.
 - همچنین می‌توانید با شماره 1-1-2 تماس بگیرید، یا از پزشک یا داروساز محلی خود بپرسید.
 - ایاب و ذهاب رایگان و واکسیناسیون خانگی در دسترس است.
- افراد صغیر برای واکسینه شدن به رضایت‌نامه والد یا سرپرست قانونی خود نیاز دارند.



چه عوارض جانبی دارد؟

- عوارض جانبی شایع عبارتند از درد، تورم و قرمزی در محل تزریق واکسن، درد عضلانی یا درد مفصل، تورم غدد لنفاوی، تب، لرز، سردرد و احساس خستگی. عوارض جانبی در کودکان خردسال نیز عبارتند از گریه، بهانه‌گیری، خواب‌آلودگی و بی‌اشتهایی.
- بروز عوارض جانبی نشانه آن است که سیستم ایمنی شما در حال **ایجاد حفاظت** است. این عوارض جانبی ممکن است بر توانایی شما در انجام برخی فعالیت‌های روزانه اثر بگذارند اما احتمالاً طی یک یا دو روز پس از دریافت واکسن ناپدید می‌شوند.
- عوارض جانبی جدی نادر هستند.



ایمنی چطور؟

- ابتلا به کووید-19 از طریق دریافت واکسن ممکن نیست. هیچ یک از واکسن‌ها حاوی ویروس عامل کووید-19 نیستند.
- واکسن‌ها روی ده‌ها هزار نفر از جمله افراد رنگین‌پوست، سالخوردگان و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای آزمایش شدند و **ایمنی و اثربخشی** آنها احراز شده است.
- از دسامبر 2020، **صدها میلیون نفر** بصورت ایمن واکسن کووید-19 دریافت کرده‌اند.
- واکسن‌های کووید-19 همچنان تحت **شدیدترین نظارت ایمنی** در تاریخ ایالات متحده قرار می‌گیرند.
- هیچ مدرکی در دست نیست که واکسیناسیون کووید-19 باعث بروز مشکلات باروری می‌شود. آنها برای افراد باردار ایمن هستند و از سوی متخصصان بارداری توصیه می‌شوند.

