



ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19

ทำไมต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19



- วัคซีนช่วยลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยจากโควิด-19 รวมถึงการต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นลองโควิดด้วย
- คุณควรฉีดวัคซีนที่แนะนำให้ครบทุกโดส เพื่อได้รับการป้องกันที่ดีที่สุด รวมถึง**วัคซีนเข็มกระตุ้นรุ่นใหม่ (bivalent)** สำหรับทุกคนที่อายุ 6 เดือนขึ้นไป* รับวัคซีนเข็มกระตุ้นรุ่นใหม่หลังจากผ่านวัคซีนเข็มสุดท้ายของคุณไปแล้วอย่างน้อย 2 เดือน โดยที่ไม่คำนึงถึงจำนวนวัคซีนเข็มกระตุ้นของวัคซีนตัวเดิม (monovalent) และประเภทของวัคซีนที่คุณได้รับในอดีต* ไม่อนุญาตให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกับเด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี ที่ได้วัคซีนไฟเซอร์ครบโดสแล้ว



ฟรี

ใครสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้บ้าง

ผู้ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป

- ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ **ฟรี** สำหรับทุกคน แม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้สึกสบายก็ตาม
- คุณมีสิทธิ์ได้รับวัคซีน และจะไม่มีการสอบถามถึงสถานะการเข้าเมืองของคุณ
- ทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีน รวมถึงหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่กำลังให้นมบุตร และผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19

วัคซีนใดบ้างที่แนะนำ?

Moderna

อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป: 2 โดสแรก รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นรุ่นใหม่ ไฟเซอร์หรือโมเดอร์น่า*

*อายุ 6 เดือน – 4 ปี ได้รับวัคซีนโมเดอร์น่าเป็นเข็มกระตุ้นเท่านั้น

Novavax

อายุ 12 ปีขึ้นไป: 2 เข็มแรก รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นใหม่ ไฟเซอร์หรือโมเดอร์น่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่

ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules

หากคุณ **มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ คุณอาจต้องฉีดมากกว่าจำนวนที่ระบุ** - กรุณาปรึกษาแพทย์ของคุณ.

วัคซีน [Johnson & Johnson](#) และ [Novavax boosters](#)

อาจสามารถฉีดให้กับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไปได้ ในบาง

สถานการณ์

VaccinateLACounty.com

(Thai)


Pfizer

อายุ 6 เดือน – 4 ปี: 3 โดสแรก (เข็มที่ 3 เป็นวัคซีนรุ่นใหม่ bivalent)

อายุ 5 ปีขึ้นไป: 2 เข็มแรก รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นรุ่นใหม่ ไฟเซอร์หรือโมเดอร์น่า*

*อายุ 5 ปี รับประทานไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้นเท่านั้น

COVID-19 Vaccination Record Card				
Last name		First Name		
Date of Birth		Medical Record Number		
Vaccine	Product/Lot #	Date	Clinic Site	
1st Dose COVID-19		__/__/__		
2nd Dose COVID-19		__/__/__		
3rd Dose COVID-19		__/__/__		





ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19

จะรับวัคซีนได้อย่างไร?

มีศูนย์ฉีดวัคซีนหลายร้อยแห่งทั่วทั้งมณฑลลอสแอนเจลิส ซึ่งหลายแห่งเปิดให้บริการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และในตอนเย็น และคุณไม่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า

เพื่อค้นหาสถานที่ฉีดวัคซีนในพื้นที่ใกล้บ้านคุณ:

- ไปที่ ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated หรือโทร **1-833-540-0473** เวลา 8.00 – 20.30 นาฬิกา
- คุณสามารถโทรไปยัง 2-1-1 หรือสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรในท้องถิ่นของคุณ
- มีบริการรถรับ-ส่งและบริการฉีดวัคซีนที่บ้านสำหรับผู้ที่เป็น

ผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนได้รับวัคซีน



ผลข้างเคียงมีอะไรบ้าง?

- ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ ปวด บวม และแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ ต่อม น้ำเหลืองบวม มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ และรู้สึกเหนื่อย นอกจากนี้ ผลข้างเคียงในเด็กเล็กยังรวมถึงการร้องไห้ อาการหุดหิด ง่วงนอน และเบื่ออาหาร
- ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันของคุณ **กำลังสร้างการปกป้องร่างกาย** โดยอาการเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวันของคุณ แต่อาการควรหายเองภายใน 1 หรือ 2 วันหลังรับวัคซีน
- ผลข้างเคียงที่รุนแรงเกิดขึ้นได้ แต่พบได้น้อย



วัคซีนปลอดภัยเพียงใด

- คุณจะไม่ได้รับเชื้อโควิด-19 จากวัคซีน ไม่มีวัคซีนใดมีไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19
- วัคซีนผ่านการทดสอบในผู้คนหลายหมื่นคน ซึ่งรวมถึงคนทุกสีผิว ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความพิการต่าง ๆ และเราพบว่าวัคซีน**ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ**
- ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 **ผู้คนหลายร้อยล้านคน**ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างปลอดภัย
- วัคซีนโควิด-19 ได้รับการ**เฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างเข้มข้น** ขณะนี้ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
- ไม่มีหลักฐานว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทำให้เกิดภาวะเป็นหมัน วัคซีนเหล่านี้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์และได้รับการแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งครรภ์

