



COVID-19 疫苗的事實



為什麼要接種COVID-19疫苗？

- 接種疫苗可以降低你因COVID-19罹患重病、住院或死亡的風險。它還可以降低罹患長期COVID症狀的風險。
- 你需要接種**所有推薦的劑量**來獲得最好的保護作用。這包括所有6個月及以上*的人接種一劑**更新版（二價）加強劑**。如果你自你接種上一劑COVID-19疫苗以來已經過去了至少2個月，請接種更新版加強劑，無論你之前接種了多少劑原始版（單價）加強劑以及接種的是哪種疫苗。*對於接種了輝瑞初始系列疫苗的6個月至4歲兒童，目前沒有加強劑疫苗獲得授權可供接種。



免費

誰可以接種疫苗？

所有年齡在6個月及以上的個人

- 每個人均可以**免費**接種COVID-19疫苗，即使你沒有健康保險。
- 你不會被問及關於移民身份的問題。
- 建議所有人接種疫苗，包括孕婦或哺乳婦女，以及已經患過COVID-19的個人。

建議接種的 COVID-19 疫苗

莫德納

6個月及以上的人：2劑初始系列疫苗加一劑更新版輝瑞或莫德納加強劑*

*6個月至4歲的兒童只可接種一劑莫德納加強劑

諾瓦瓦克斯 (Novavax)

12歲及以上的人：2劑初始系列疫苗加一劑更新版輝瑞或莫德納加強劑

請查看 ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules 瞭解更多資訊。

如果你的**免疫功能受損**，你可能需要接種額外的劑量——請諮詢你的醫生。

替代選擇：在某些情況下，[強生疫苗](#)和[諾瓦瓦克斯加強劑](#)可用於18歲及以上的人。


輝瑞

6個月至4歲的兒童：3劑初始系列疫苗（第3劑是更新版二價疫苗）

5歲及以上的人：2劑初始系列疫苗加一劑更新版輝瑞或莫德納加強劑^

^5歲的兒童只能接種一劑輝瑞加強劑

COVID-19 Vaccination Record Card			
Last name		First Name	
Date of Birth		Medical Record Number	
Vaccine	Product/Lot #	Date	Clinic Site
1st Dose COVID-19		—/—/—	
2nd Dose COVID-19		—/—/—	
3rd Dose COVID-19		—/—/—	





COVID-19 疫苗的事實

如何接種疫苗

在整個洛杉磯縣有數百個疫苗接種點——許多會在週末和晚上開放，且無需預約。

在你附近找到一處疫苗接種點：

- 請訪問 ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated；或致電**1-833-540-0473**，服務時間為：每天早上8點至晚上8:30。
- 你也可以致電2-1-1，或者可以諮詢你的醫生或當地藥劑師。
- 可提供免費交通工具和居家接種疫苗服務。

未成年人需要父母或法定監護人的同意才能接種疫苗。



疫苗有哪些副作用？

- 接種疫苗後的常見副作用包括：接種疫苗的部位疼痛、腫脹和發紅、肌肉或關節疼痛、淋巴結腫大、發燒、發冷、頭痛和感覺疲倦。幼兒接種疫苗後可能出現的副作用還包括哭泣、煩躁、困倦和食欲不振。
- 出現副作用表明你的免疫系統正在**建立保護作用**。副作用可能會影響你進行一些日常活動的能力，但它們應該會在接種疫苗後的一兩天內消失。
- 嚴重的副作用很罕見。



疫苗的安全性如何？

- 接種疫苗不會讓你感染COVID-19。沒有一種疫苗含有導致COVID-19的病毒。
- 這些疫苗已在數萬人身上進行了測試，其中包括有色人種、老年人和有健康問題的個人，測試結果發現疫苗是**安全且有效**的。
- 自2020年12月以來，已有**數億人**安全接種了COVID-19疫苗。
- COVID-19疫苗將繼續接受美國歷史上最**嚴格的安全監測**。
- 沒有證據表明COVID-19疫苗會導致生育問題。它們對孕婦是安全的，且妊娠專家建議孕婦接種疫苗。

