

你应该了解的猴痘信息

猴痘是由猴痘病毒引起的传染病。任何与猴痘患者有过密切个人接触的人均有感染的风险。

症状通常在接触后 5-21 天出现

主要症状

皮疹



皮疹可能：

- 看起来像丘疹、疱疹、水疱、疮或结痂
- 出现在身体任何部位，包括生殖器、肛门、口腔、手部和面部
- 仅出现在一个部位或遍布全身
- 瘙痒或疼痛（尤其是如果在口腔或肛门内）

其他症状

流感样症状



发烧/发冷



乏力、肌肉酸痛
和头痛



淋巴结肿大

- 流感样症状可能在出现皮疹前 1-4 天和出现皮疹后出现
- 并不是所有人都有这些症状

有关猴痘的更多信息，请访问：ph.lacounty.gov/Monkeypox 2022/9/9 (Simplified Chinese)



COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health

猴痘是如何传播的

目前已知猴痘通过密切、亲密和/或长时间接触传播，包括：

- 在性交和其他亲密接触（例如接吻、按摩和搂抱）过程中，皮肤直接接触皮疹、结痂或疮。
- 接触猴痘患者使用过但未清洗的物品和织物（例如衣服、床上用品、毛巾或性玩具）。
- 接触呼吸道分泌物。这种情况可能在长时间和密切的面对面接触或亲密接触中发生。

从出现症状，直到皮疹痊愈、结痂脱落并长出新皮肤层之前，猴痘患者有可能将病毒传播给他人。这通常需要 2 到 4 周。

患有猴痘的孕妇会通过胎盘将病毒传染给胎儿。

偶尔交谈或经过猴痘患者身旁**不会导致猴痘传播**。

疫苗现可供高风险人群接种，其中包括已经接触过猴痘的人。

抗病毒治疗现可供猴痘重症患者或有可能成为重症患者的人群使用。

更多信息，请咨询您的医生或访问 ph.lacounty.gov/Monkeypox。

如果您出现新的、不明原因的皮疹或病变，请立即**联络您的医生**。如果您接触过猴痘患者或疑似猴痘患者，这一点尤为重要。

如果您没有医生：

- 请致电公共卫生局：1-833-540-0473（每天早上 8 点至晚上 8:30），或
- 前往您附近的[公共卫生局性健康诊所](#)。



扫描二维码查找
性健康诊所