

የሎስ አንጀለስ ካውንቲ የአዋቂ የሳንባ ነቀርሳ የስጋት ግምገማ

- ይህን መሳሪያ ምልክት ለማያሳዩ አዋቂዎች ለቲቢ (TB) በሽታ መመርመሪያ ይጠቀሙ።
- ድጋሚ ምርመራ ሊደረግ የሚገባው የቀድሞ ምርመራ ውጤታቸው ኔጌቲቭ (አሉታዊ) ለሆኑ፣ እና ከመጨረሻው ምርመራ በኋላ **አዲስ** የስጋት ሁኔታዎች ላሉባቸው ሰዎች ብቻ ነው።
- የTB ምልክቶች ወይም ከአክቲቭ (ተላላፊ) የቲቢ በሽታ ጋር የሚመሳሰል ያልተለመደ የደረት ኤክስሬይ → የአክቲቭ (ተላላፊ) TB በሽታ ምርመራ
የተሟላ የአክቲቭ (ተላላፊ) የTB በሽታ ምርመራ የሚከተሉትን ያካትታል፤ የበሽታ ምልክት የማጣሪያ ምርመራ፣ የደረት ኤክስሬይ፣ እና ከተገለጹ፣ አክታ AFB ምርመራ፣ የረቂቅ ተሕዋሲያን መስፋፋት ምርመራ እና ኑክሌክ አሲድ አምፕሊፊኬሽን። ኔጌቲቭ የቱቤርኩሊን የቆዳ ምርመራ ወይም ኢንተርፌሮን ጋማ ሪሊዝ አሴይ አክቲቭ የTB በሽታ አለመኖሩን አያረጋግጡም።

አግባብነት ያላቸውን ከታች ያሉት የስጋት ሳጥኖች ላይ ምልክት ያድርጉ።
ከዚህ በታች ካሉት ማንኛውም 4 ሳጥኖች ላይ ምልክት ከተደረገ የTB በሽታ ምርመራ ማድረግ ይመከራል።
የTB በሽታ የምርመራ ውጤት ፖዘቲቭ ከሆነ እና አክቲቭ TB ሊሆን አይችልም ከተባለ፣ የTB በሽታ ሕክምና እንዲደረግ ይመከራል።

ወሊድ፣ ጉዞ፣ ወይም መኖሪያ ከፍተኛ የTB መጠን ያለበት አገር ውስጥ ቢያንስ ለ 1 ወር

- ከዩናይትድ ስቴትስ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ፣ ወይም ምእራብ እና ሰሜን አውሮፓ አገሮች ውጭ ያሉ አገራትን ያካትታል
- ግብዓቶች በዚህ ቡድን ውስጥ ቅድሚያ የሚሹ ከሆኑ፣ ቢያንስ የሚባባስ አንድ የሕክምና ስጋት ላለባቸው ታካሚዎች **ቅድሚያ መስጠት** (ለዝርዝሩ የመረጃ ወረቀቱን ይመልከቱ)
- Interferon Gamma Release Assay ተመራጭ ነው ከ Tuberculin Skin Test ከዩኤስ ውጪ ለተወለዱ እድሜያቸው ≥ 2 አመት ለሆኑ

የሰውነት የበሽታ መከላከል ኃይል ድክመት፣ አሁን ያለ ወይም የታቀደ

- የHIV በሽታ፣ የሰውነት አካል ንቅለተካላ ተቀባይ፣ በTNF-አልፋ አንታጎኒስት የታከሙ (ለምሳሌ፡ ኢንፍሊክሲን ማብ፣ ኢታኔርሴፕት፣ ሌሎች)፣ ከፕሬዲንሶን ጋር እኩ የሆነ ስቲይሮይድ ≥ 15 ሚግ/ባቀን ለ ≥ 1 ወር) ወይም ሌላ የሰውነት የበሽታ መከላከል ኃይል የሚያዳክም መድሃኒት

የቅርብ ንኪኪ ተላላፊ የTB በሽታ ካለበት ሰው ጋር በማንኛውም ጊዜ

- የበሽታ መቆጣጠር እና መከላከል ማእከላት የንኪኪ ግምገማ እና በበሽታው የተያዙትን ሰዎች ማከም የዩኤስ የTB ማስወገጃ ዋና ስልት መሆኑን ያመለክታሉ።

የቤት አልባነት ወይም የእስራት የቀድሞ ታሪክ

- የዩኤስ የመከላከል አገልግሎት ግብረ ኃይል (USPSTF) ከፍተኛ ተጋላጭነት ባለው የታጩቀ በታ የሚኖሩ ሰዎችን ጨምሮ (ለምሳሌ የቤት አልባ መጠለያዎች እና የማረሚያ ተቋማት) ለTB በሽታ ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸውን ሰዎች ላይ ምርመራ እንዲደረግ ይመከራል።

ምንም ዓይነትም፣ በዚህ ጊዜ ምንም የTB ምርመራ አልተመለከተም።

አቅራቢ፡ _____
የግምገማ ቀን፡ _____

የታካሚ ስም፡ _____
የትውልድ ቀን፡ _____
(አግባብነት ካለው እዚህ ላይ ተለጣፊ)

ይመልከቱ የሎስ አንጀለስ ካውንቲ የአዋቂ የሳንባ ነቀርሳ ግምገማ የተጠቃሚ መምሪያን ስለዚህ መሳሪያ አጠቃቀም ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት።
ለALAC አጠቃቀም ከካሊፎርኒያ የሳንባ ነቀርሳ የስጋት ግምገማ ተሻሻሎ የቀረበ በአቅራቢዎች ገጽ ይገኛል በ www.ctca.org የቅርብ ጊዜ እትም ያሉት መሆኑን ለማረጋገጥ ይጎብኙ <http://publichealth.lacounty.gov/tb/providertoolkit.htm>

