

ارزیابی خطر بیماری سل بزرگسالان در شهرستان لس آنجلس

- از این ابزار شناسایی بزرگسالان بدون علائم برای آزمایش دهی عفونت بیماری سل استفاده کنید
 - آزمایش دهی مجدد فقط باید در افرادی صورت گیرد که قبلاً آزمایش منفی داشته اند و از زمان آخرین ارزیابی، عوامل خطر جدید دارند.
 - برای علائم بیماری سل یا عکسبرداری اشعه ایکس غیرطبیعی قفسه سینه که با بیماری فعال سل تطبیق دارد - برای بیماری فعال سل ارزیابی کنید
- ارزیابی کامل برای بیماری فعال سل شامل این موارد است: غربالگری علائم، عکسبرداری اشعه ایکس قفسه سینه، و اگر نشان شده، آزمایش دهی لکه هایی که آب دهان زیر میکروسکوپ باقی می گذارد (AFB)، کشت میکروب در آزمایشگاه و اسید نوکلئیک تقویت شده. یک آزمایش منفی پوست برای بیماری سل یا "آزاد کردن سنجش اینترفرون گاما" بیماری فعال سل را رد نمی کند (آن یک آزمایش کامل خون است که عفونت نهفته سل را از بیماری سل تشخیص نمی دهد)

جعبه های مناسب عامل خطر را در زیر علامت بزنید.

اگر هر یک از 4 جعبه زیر علامت زده شده است، آزمایش دهی عفونت بیماری سل توصیه می شود.

اگر نتیجه آزمایش عفونت بیماری سل مثبت است و بیماری فعال سل رد شده است، درمان عفونت بیماری سل توصیه می شود.

تولد در، مسافرت به، یا سکونت در یک کشور که میزان بیماری سل حداقل به مدت 1 ماه در آن بالا رفته است

- شامل کشورهایی بجز ایالات متحده، کانادا، استرالیا، نیوزیلند یا کشورهای اروپای غربی و شمالی می شود.
- اگر منابع در این گروه مستلزم تعیین اولویت هستند، بیمارانی را که حداقل دارای یک خطر پزشکی برای پیشروی هستند را اولویت قرار دهید (برای فهرست، گزاره برگ را ملاحظه کنید)
- برای افرادی که در ایالات متحده متولد نشده اند و 2 سال یا بیش از 2 سال دارند، اینترفرون گاما به آزمایش سل بر روی پوست ترجیح داده می شود.

سرکوب سیستم ایمنی، در حال حاضر یا برنامه ریزی شده (برای آینده)

- عفونت اچ آی وی، دریافت کننده پیوند عضو، تحت درمان توسط TNF-alpha antagonist (به عنوان مثال، infliximab etanercept، غیره)، استروئید (کورتون) معادل پردنیزون 15 میلیگرم یا بیشتر، یکبار در روز، برای 1 ماه یا بیشتر یا داروی دیگر سرکوب کننده سیستم ایمنی

تماس نزدیک با فرد دارای بیماری سل مسری در هر زمان

- مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری نشان می دهند که ارزیابی تماس ها و درمان افراد آلوده منشأ تماس، یک جزء مهم از راهبرد ایالات متحده برای محو بیماری سل است.

سابقه بی خانمانی یا حبس بودن

- نیروی وظیفه خدمات پیشگیری ایالات متحده (USPSTF)، غربالگری جمعیت هایی را که در معرض خطر افزایش یافته برای عفونت بیماری سل بر مبنای افزایش خطر مواجهه که شامل افرادی می شود که در محیط های تجمعی با خطر بالا زندگی کرده اند، (به عنوان مثال، پناهگاه های افراد بی خانمان و تجهیزات اصلاحی) را توصیه می کند.

هیچکدام؛ هیچ آزمایش دهی بیماری سل در حل حاضر نشان داده نشده است.

نام بیمار: _____

تاریخ تولد: _____

(اگر قابل اطلاق است، برجسب را اینجا بزنید)

ارائه دهنده: _____

تاریخ ارزیابی: _____

برای اطلاعات بیشتر درباره استفاده از این ابزار، راهنمای کاربر ارزیابی خطر بیماری سل بزرگسالان شهرستان لس آنجلس را ملاحظه کنید. اقتباس از ارزیابی خطر بیماری سل کالیفرنیا، سازگار شده برای استفاده شهرستان لس آنجلس در صفحه ارائه کنندگان در www.ctca.org موجود است.

برای اطمینان از دارا بودن آخرین نسخه، از <http://publichealth.lacounty.gov/tb/providertoolkit.htm> دیدن کنید.

