

Оценка риска наличия туберкулеза у взрослых жителей округа Лос-Анджелес

- Используйте данный опросный лист для выявления бессимптомных лиц среди **взрослого населения**, которым показано тестирование на наличие туберкулезной инфекции (ТИ)
- Повторное тестирование следует проводить только лицам, ранее получившим отрицательный результат, но подвергшимся **новым** факторам риска с момента последней оценки
- При наличии клинических или рентгенологических признаков активной формы ТИ → Требуется проведение диагностики активной формы ТИ в организме

Комплексная диагностика активной формы туберкулеза включает: изучение клинических симптомов, рентгенографию органов грудной клетки, и, при наличии показаний, микроскопию и посев мокроты с целью выявления микобактерий туберкулеза (кислотоустойчивых бацилл [AFB]), культивирование микобактерий туберкулеза на питательной среде, а также исследование методом амплификации нуклеиновых кислот. Отрицательная туберкулиновая кожная проба или отрицательный результат анализа крови, основанного на выявлении высвобождения гамма-интерферона, не исключают наличие активной формы ТИ.

Отметьте галочкой нижеприведенные пункты, которые применимы лично к вам.

Тестирование на ТИ рекомендуется, если отмечен любой из 4-х пунктов.

Если результат теста на ТИ является положительным, и наличие активной формы туберкулеза исключено, рекомендуется терапия латентной ТИ.

Рождение, посещение или проживание в стране с повышенным уровнем заболеваемости ТИ на протяжении как минимум 1 месяца

- К таким странам не относятся США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, а также страны Западной и Северной Европы
- Если ресурсы требуют приоритизации внутри этой группы, **отдавайте приоритет** пациентам с наличием по меньшей мере одного медицинского риска прогрессирования заболевания (см. Фактологический бюллетень для ознакомления со списком рисков)
- Для лиц в возрасте от 2 лет, не рожденных в США, анализ высвобождения гамма-интерферона является более предпочтительным, чем туберкулиновая кожная проба

Иммуносупрессия (угнетение иммунитета), текущая или планируемая

- Терапия ВИЧ-инфицированных людей, реципиентов трансплантатов, основанная на приеме ингибиторов ФНО (в частности, инфликсимаба, этанерцепта, и др.), стероидных эквивалентов преднизолона в дозировке ≥ 15 мг/день в течение ≥ 1 месяца, или прочих иммуносупрессивных препаратов

Тесный контакт с лицами, инфицированными туберкулезом, в любой момент времени

- Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что анализ контактов и терапия инфицированных лиц является важным компонентом стратегии США по ликвидации туберкулеза

Пребывание в условиях бездомности или в местах лишения свободы

- Целевая группа профилактической службы США (USPSTF) рекомендует проведение скрининга на туберкулез определенных групп населения, подверженных повышенному риску заболевания туберкулезом, в том числе лиц, проживавших в местах скопления людей высокого риска (например, в приютах для бездомных и исправительных учреждениях)

Факторы риска отсутствуют; В настоящее время тестирование на туберкулез не показано.

Медицинский работник: _____

Дата опроса: _____

Имя пациента: _____

Дата рождения: _____

(Разместите наклейку здесь, если применимо)

Ознакомьтесь с [Руководством по проведению оценки риска наличия туберкулеза у взрослых жителей округа Лос-Анджелес](#) для получения дополнительной информации о применении данного опросного листа.

Адаптировано для округа Лос-Анджелес из источника «Оценка риска наличия туберкулеза у жителей штата Калифорния», размещенном по адресу www.ctsa.org на странице для поставщиков медицинских услуг (вкладка «PROVIDERS»). Наиболее актуальная версия опросного листа доступна по адресу <http://publichealth.lacounty.gov/tb/providertoolkit.htm>.

