

## Pagtatasa ng Panganib sa Tuberkulosis ng Matatanda ng Los Angeles County

- Gamitin ang kagamitang ito para matukoy ang walang mga sintomas na mga **matatanda** para sa pagsusuri ng impeksyon sa TB
- Ang pagsusuring muli ay dapat lang gawin sa mga taong dati ng nasuring negatibo, at sa **ngayon** ay may kadahilanan ng panganib mula noong huling pagtatasa
- Para sa mga sintomas ng TB o hindi normal na x-ray ng dibdib alinsunod sa aktibong sakit sa TB → Suriin para sa aktibong sakit sa TB

*Kumpletuhin ang pagsusuri para sa aktibong sakit sa TB kabilang ang mga: pagsasala ng sintomas, x-ray ng dibdib, at kung ipinakikita, pagpahid ng laway na AFB, mga sinusuri [cultures], at pagpapalawak ng pagsusuring nucleic acid. Ang negatibong pagsusuring tuberculin sa balat o interferon gamma release assay ay hindi isinasantabi ang aktibong sakit sa TB.*

I-tsek ang naaangkop na mga kahon sa panganib sa ibaba.

Ang pagsusuri sa impeksyon sa TB ay inirekomenda kung ang alinman sa 4 ng mga kahon sa ibaba ay may tsek.

Kung ang resulta ng pagsusuri ng impeksyon sa TB ay positibo at aktibong sakit sa TB ay hindi maisasantabi Ang paggamot sa impeksyon sa TB ay inirekomenda.

### Panganganak, paglalakbay, o residente sa isang bans na mayroong mataas na antas ng TB ng hindi bababa sa 1 buwan

- Kabilang ang mga bansa maliban sa Amerika, Canada, Australia, New Zealand, o Western at mga bansa ng Northern European
- Kung ang maaring mga magagamit ay nag-aatas ng pagbibigay prayoridad sa loob ng grupo, **bigyan ng prayoridad** ang mga pasyente na mayroong hindi bababa sa isang panganib na medikal para sa pagpapatuloy (tingnan ang Pahina ng Katotohanan para sa listahan)
- Interferon Gamma Release Assay ay mas pinipili kaysa sa Pagsusuri ng Balat na Tuberculin para sa mga taong hindi ipinanganak sa Amerika  $\geq 2$  taong gulang

### Pagpigil ng Imyunidad [Immunosuppression], kasalukuyan o plano

- Impeksyon sa HIV, tumanggap ng organ transplant, ginamot ng TNF-alpha antagonist (e.g., infliximab, etanercept, others), katumbas ng steroids na prednisone  $\geq 15$  mg/araw para  $\geq 1$  buwan) o iba pang pagpigil sa imyunidad na gamot

### Malapitang nakasalamuha ng iba na mayroong impeksyon ng sakit na TB sa anumang oras

- Ang Mga Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit at Pagpigil [Centers for Disease Control and Prevention] ay nagpapaalam na ang pagsusuri sa mga nakasalamuha at paggamot sa mga naiimpeksyong mga nakasalamuha ay isang mahalagang bahagi ng stratehiya ng Amerika para mawala ang TB

### Kasaysayan ng kawalan ng tirahan o pagkakulong

- Ang U.S. Preventive Service Task Force (USPSTF) ay nagrekomenda ng pananala ng populasyon na nasa mataas na panganib ng impeksyon sa TB batay sa mataas na panganib ng pagkakalantad kabilang ang mga taong nanirahan sa mataas na panganib ng mga kapaligiran ng pagtitipon-tipon (hal., mga tinutuluyan ng mga walang tirahan at mga pasilidad ng kulungan)

### Wala; walang pagsusuri ng TB ang ipinakikita sa ngayon.

Tagagamot [Provider]: \_\_\_\_\_

Petsa ng Pagtatasa: \_\_\_\_\_

Pangalan ng Pasyente: \_\_\_\_\_

Petsa ng Kapanganakan: \_\_\_\_\_

(Ilagay ang istiker dito kung naaangkop)

Tingnan ang [Gabay ng Gumagamit sa Pagtatasa ng Panganib sa Tuberkulosis ng Matatanda ng Los Angeles County \[Los Angeles County Adult Tuberculosis Risk Assessment User Guide\]](#) para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa paggamit ng mga kagamitang ito. Iniangkat para sa paggamit sa LACmula sa the California Tuberculosis Risk Assessment na nasa pahina ng PROVIDERS sa [www.ctca.org](http://www.ctca.org). Para masigurado na mayroong kang pinakabagong bersyon, bisitahin ang <http://publichealth.lacounty.gov/tb/providertoolkit.htm>