

Оцінка ризику туберкульозу серед дорослих осіб в окрузі Лос-Анджелес

- Використовуйте цей документ для виявлення безсимптомних **дорослих осіб** для проведення аналізу на туберкульозну інфекцію
- Повторний аналіз слід проводити лише у осіб, які раніше мали негативний результат аналізу, і у яких з'явилися **нові** фактори ризику з моменту останньої оцінки
- У разі симптомів туберкульозу чи результатів рентгенологічного дослідження органів грудної клітки з відхиленнями від норми, що відповідають активному захворюванню на туберкульоз, →Провести обстеження на активну форму туберкульозу
Повне обстеження на активну форму туберкульозу передбачає: аналіз симптомів, рентгенологічне дослідження органів грудної клітки і, за наявності показань, мазки слини на кислостійкі бактерії, посіви й аналіз методом ампліфікації нуклеїнових кислот. Негативний результат туберкулінової шкірної проби або гамма-інтерферонового тесту не виключає активного захворювання на туберкульоз.

Відмітьте нижче відповідні пункти з факторами ризику.

Аналіз на туберкульозну інфекцію рекомендується, якщо буде відмічений хоча б один з перелічених нижче 4 пунктів.

Якщо результат аналізу на туберкульозну інфекцію позитивний, і активна форма туберкульозу виключена, рекомендується пройти лікування туберкульозної інфекції.

Народження, поїздка чи проживання у країні з підвищеним рівнем захворюваності на туберкульоз протягом щонайменше 1 місяця

- Сюди входять будь-які країни, окрім США, Канади, Австралії, Нової Зеландії чи країн Західної та Північної Європи
- Якщо ресурси потребують визначення пріоритетів у цій групі, визначте **пріоритетність** пацієнтів із щонайменше одним медичним ризиком прогресування (перелік див. в інформаційній довідці).
- Гамма-інтерфероновому тесту має віддаватися перевага порівняно з туберкуліновою шкірною пробю для осіб, що народилися за межами США, віком ≥ 2 років

Імуносупресія, поточна чи планована

- ВІЛ-інфекція, трансплантація органу, лікування антагоністами ФНП-альфа (наприклад, інфліксимаб, етанерцепт тощо), стероїдами, що еквівалентні преднізону в дозі ≥ 15 мг/добу, протягом ≥ 1 місяця чи іншими лікарськими засобами, які пригнічують імунітет

Тісний контакт із хворою на туберкульоз людиною, будь-коли

- Центри з контролю та профілактики захворювань зазначають, що вивчення контактів і лікування інфікованих осіб є важливою складовою стратегії США щодо боротьби з туберкульозом

Інформація про безхатність або тюремне ув'язнення

- Американська робоча група з профілактичних заходів (USPSTF) рекомендує проводити скринінг груп населення з підвищеним ризиком туберкульозної інфекції на основі підвищеного ризику зараження, зокрема серед осіб, які жили у місцях скупчення людей з високим ризиком (наприклад, притулки для безхатченків і виправні установи).

Жоден з варіантів; на поточний момент показання для аналізу на туберкульоз відсутні.

Постачальник медичних послуг: _____

Дата обстеження: _____

Ім'я пацієнта: _____

Дата народження: _____

(Місце для вкладки, у передбачених випадках)

Додаткову інформацію про використання цього документу див. у Посібнику щодо оцінки ризику туберкульозу серед дорослих осіб в окрузі Лос-Анджелес.

Адаптовано для використання в окрузі Лос-Анджелес на основі Оцінки ризику туберкульозу в штаті Каліфорнія, яка доступна на сторінці ПОСТАЧАЛЬНИКІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ на сайті www.ctsa.org Найновішу редакцію документа див. за посиланням <http://publichealth.lacounty.gov/tb/providertoolkit.htm>





Січень 2018 року - Ukrainian