

## Я делал(а) прививку против туберкулеза (БЦЖ) у себя на родине.

Могу ли я заболеть туберкулезом?



Люди, привившиеся против туберкулеза, по-прежнему подвержены риску заражения

Иммунная защита, выработанная в результате вакцинации, со временем **ослабевает**

Даже если вы проходили вакцинацию, положительная реакция туберкулиновой пробы означает наличие у вас ЛТИ

Прием препаратов для лечения ЛТИ защитит от прогрессирования туберкулеза в активную стадию

Замедлит ли факт наличия у меня ЛТИ процесс рассмотрения моего заявления на иммиграцию?



Прием препаратов для лечения ЛТИ **НЕ** замедлит процесс рассмотрения вашего иммиграционного заявления




Врач, проводящий ваш иммиграционный медосмотр, сообщит о наличии у вас ЛТИ в местный Департамент здравоохранения



Местный Департамент здравоохранения может с вами связаться, **чтобы предоставить вам поддержку**



 COUNTY OF LOS ANGELES  
**Public Health**  
Tuberculosis Control Program

## Что означает для меня наличие латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ)?



Вы можете **лечить ЛТИ и предотвратить** прогрессирование инфекции в активную стадию, а также **передачу** ее своим близким



## Что такое ЛТИ? Как я им заразился/ заразилась?

ЛТИ – это инфекция, при которой в организме присутствуют микобактерии туберкулеза в латентном (спящем) состоянии

Вы заразились ЛТИ воздушно-капельным путем, **вдохнув микобактерии туберкулеза**, выделенные в воздух больным человеком

Вы можете заразиться ЛТИ, даже если делали прививку от туберкулеза (БЦЖ)

Существует **множество различий** между латентной и активной формами туберкулеза:

Человек, зараженный ЛТИ:

Не испытывает недомогания

Рентгеновский снимок органов грудной клетки не показывает отклонений от нормы

Не способен передавать бактерии ТИ другим людям

Терапия может предотвратить переход туберкулеза в активную форму

Терапия короче и проще (3–4 месяца)

Человек, больной туберкулезом в активной форме:

Может испытывать симптомы болезни

Рентгеновский снимок органов грудной клетки может показывать отклонения от нормы


Способен передавать бактерии ТИ другим людям

Терапия может вылечить активную форму туберкулеза

Терапия более продолжительна (6–12 месяцев или более)

## Почему я должен/должна принимать препараты для лечения ЛТИ?

Если не принимать препараты для лечения ЛТИ, туберкулез может прогрессировать в активную стадию



Латентная ТИ

Активная ТИ

Туберкулез в активной форме является **серьезным заболеванием**, способным значительно ухудшить состояние вашего здоровья



Половина

людей, больных туберкулезом в активной форме, попадают в больницу



1 из 6

людей, больных туберкулезом в активной форме, умирает в течение 5 лет

## Как я могу получить препараты для лечения ЛТИ?

Узнайте у врача, проводящего ваш иммиграционный медосмотр, сможет ли он назначить вам курс медикаментозной терапии

Если он не может этого сделать, обратитесь к своему лечащему врачу с просьбой назначить вам курс медикаментозного лечения (предъявите результаты своих анализов)

Вы также можете попросить местное отделение здравоохранения направить вас в клинику для получения курса лечения

Если вы не начнете противотуберкулезную терапию, вероятность прогрессирования вашей ЛТИ в активную форму составляет 1 к 10

**Защитите себя от прогрессирования туберкулезной инфекции в активную форму и передачи ее окружающим людям.**