

我已在原籍国接种了结核病疫苗（卡介苗）。

我还会患结核病吗？



接种过结核病疫苗的人群仍可能患上结核病

结核病疫苗的保护作用会随着时间的推移而消失

即使您已接种过疫苗，但血液检测呈阳性同样意味着您患有潜伏性结核病

服用相关治疗药物能够避免潜伏性结核病发展为活动性结核病

潜伏性结核病会推迟我的移民申请吗？



服用潜伏性结核病治疗药物不会推迟您的移民申请




您的移民医生会将您患有潜伏性结核病的情况告知当地卫生部门



当地卫生部门可能会联系您，并为您提供帮助



 COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health
Tuberculosis Control Program

患有潜伏性结核病 (LTBI) 对我有什么影响？



您可以治疗潜伏性结核病，以避免传染亲友



什么是潜伏性结核病？ 我为什么会患上潜伏性结核病？

潜伏性结核病是指感染了潜伏（或沉睡）在体内的肺结核病菌

您可能会因为吸入了潜伏性结核病患者呼出的空气而感染潜伏性结核病

即使接种了结核病疫苗（卡介苗），但您仍有可能患上潜伏性结核病

潜伏性结核病和活动性结核病有许多不同之处：

潜伏性结核病患者：

不会感到恶心

胸部 X 光检查结果正常

不会将结核病菌传播给他人

进行治疗可以避免其发展成活动性肺结核

治疗时间较短（3-4 个月）且更容易

活动性结核病患者：

可能会感到恶心

X 光检查结果可能异常


可能将结核病菌传播给他人

活动性肺结核通过治疗可以治愈

治疗时间较长（6-12 个月或更长）

为什么要服用潜伏性结核病治疗药物？

如果不服用治疗药物，
则您的潜伏性结核病可能发展为活动性结核病



潜伏性结核病

活动性结核病

活动性结核病属于严重疾病，
其症状非常严重



50%
的活动性结核病患者需要住院治疗



六分之一
活动性结核病患者
的生存期为 5 年以内

如何获取潜伏性结核病治疗药物？

请咨询移民医生
是否可以为您订购药物

如果不能，请联系您的常规医生，请他们为您订购药物（请携带您的血液检测报告）

您也可以联系当地卫生部门，请他们为您推荐治疗诊所

如果不服用药物，则您的潜伏性结核病将有 **10%** 的可能发展成活动性结核病

请避免
发展成活动性
结核病并将其
传播给亲友