

我在我的原居住國接種了結核病疫苗 (BCG)。
我還會罹患結核病嗎？



接種了結核病疫苗的人
仍會罹患結核病 (TB)

結核病疫苗的保護作用
會隨著時間的推移而消失

即使您接種了疫苗，
血液檢測結果呈陽性意味著您患有
潛伏性結核感染 (LTBI)

服用 LTBI 藥物將保護您免於罹患
活動性結核病

患有 LTBI 會延遲我的移民
申請嗎？




服用治療 LTBI 的藥物不會延
遲您的移民申請



您的移民醫生會讓您的當
地衛生部門知道您患有
LTBI



當地衛生部門可能會與您聯
繫以提供支援



患有潛伏性結核感
染 (LTBI) 對我意味
著什麼？



您可以治療 LTBI 以防止您和您的
親人生病



什麼是 LTBI? 我是如何感染的?

LTBI 是一種潛伏（或沉睡）在您體內的結核菌感染

您從與結核病患者
呼吸同一空間的空氣
而感染 LTBI

即使您已經接種了結核病疫苗
(BCG) 也仍會感染 LTBI

LTBI 和活動性結核病有 很多不同之處:

LTBI 患者:

不會感覺不適

胸部 X 光檢
查正常

不會將結核病
病菌傳播給其他人

治療能夠預防
活動性結核病

治療期較短
(3至4個月) 且較容易

活動性結核病
患者:

可能感覺不適

胸部 X 光檢查可
能異常

會將結核病
病菌傳播給其他人

治療能夠治愈活動
性結核病

治療期較長 (6至
12個月或更長)

我為什麼應該服用 治療 LTBI 的藥物?

如果您不服用治療 LTBI 的藥
物，它可能發展成活動性結核病



活動性結核病是一種嚴重疾病，
會使您病得很重



一半

患有活動性結
核病的人需要
住院治療



六分之一

患有活動性
結核病的人在5年內死亡

我如何獲得治療 LTBI 的 藥物?

詢問移民醫生
看他們是否能為您開藥

如果他們不能，去看您的固定
醫生，讓他們為您開藥
(請帶上您的血液檢查結果文件)

您也可以聯繫您的當地衛生部門，
將您轉介至一家診所接受治療

如果您不服用藥物，有十分之一
的機率您的 LTBI 會發展成爲
活動性結核病

保護自己
防止罹患活動性結核病
和將它傳染給您的親人