

治疗结核菌感染的药物可能有哪些副作用？

这些药物的副作用很罕见，但可能包括：

- 恶心
- 呕吐
- 尿液呈深色
- 皮疹
- 皮肤和/或眼睛发黄
- 食欲不振
- 手和/或脚麻木

如果您出现任何这些副作用，请立即告知您的医生、护士或来自公共卫生局的训练有素的卫生工作者。

公共卫生局将发挥什么作用？

卫生局关心您和您的家人，并提供对结核菌感染的治疗。如果您接受公共卫生局的治疗，将由接受过有关处理结核菌感染或活动性结核病患者专门培训的医生或执业护士为您看诊。

有关结核病的更多信息，请访问：

www.publichealth.lacounty.gov/tb

结核菌感染

保持健康须知




什么是结核菌感染？

如果您感染了结核病菌，则结核病菌将在您的体内存在，但处于“沉睡”状态。如果您感染了结核病菌，您不会出现症状，可能不会感到不适，也不会将结核病菌传播给其他人。但是，如果您的免疫系统功能削弱，这些结核病菌可能会“醒来”并繁殖。然后您可能会患上活动性结核病。如果您患有活动性结核病，您会出现咳嗽、夜间盗汗、倦怠和体重减轻等症状。此外，您可能会将结核病菌传播给其他人。结核病主要影响肺部，但也会影响身体的其他部位。如果不及时治疗，结核病可导致死亡。

个人如何受到感染？

当活动性结核病患者咳嗽、打喷嚏、大笑、说话或唱歌时，结核病菌就会在空气中传播。如果您吸入含有结核病菌的空气，您可能会被感染。但是您不会从衣服、餐具、食物、床上用品或与活动性结核病患者身体接触中感染结核病。



结核菌感染的治疗方法是什么？

如果您感染了结核病菌，您可能会患上结核病。可能会立即发病，也可能在几年后发病。结核菌感染可以用抗结核药物治疗。现在有更短的治疗方案，可以在3到4个月内完成治疗。

如果我没有感到不适，为什么还要吃药？

如果您不服用治疗结核菌感染的药物，您可能会患上活动性结核病。在您开始服药后许多结核病菌会被杀死，但有些病菌会在您的体内存活很长时间。只要体内还有结核病菌，它们就可能“醒来”并繁殖，进而导致您患病。如果您正在服用抗结核病药物，请务必按照医生或医疗服务提供者的处方吃完药。

如何判断自己是否感染了结核病菌？

接受结核病皮肤测试或血液检查。如果您接受皮肤测试，请务必在2到3天后返回医生处获取测试结果。如果您进行血液检查，则无需返回诊所获取结果。

结核菌感染和活动性结核病有什么区别	
结核菌感染	活动性结核病
没有症状	严重咳嗽 3 周或更长时间
没有感到不适	咳血
皮肤测试或血液检查为阳性（通常）	皮肤测试或血液检查为阳性（通常）
胸部 X 光检查正常（通常）	胸部 X 光检查异常（通常）
不会传播结核病	食欲不振
如果不完成治疗，可能会发展为活动性结核病	虚弱、倦怠
	寒战、发烧、夜间盗汗
	体重减轻

如果皮肤测试或血液检查结果呈阳性怎么办？

皮肤测试或血液检查结果呈阳性通常意味着您感染了结核病菌，但这并不一定意味着您患有活动性结核病。还需要进行其他检查，例如胸部 X 光检查或检测痰液样本，以确定您是否患有活动性结核病。

我应该什么时候接受皮肤测试或血液检查？

如果您符合以下条件，则应接受结核病检测：

- 有活动性结核病的症状
- 与活动性结核病患者相处了很长时间
- 免疫系统功能低下，如有艾滋病毒感染（HIV）或糖尿病
- 注射过违禁药物
- 最近从拉丁美洲、加勒比海地区、非洲、亚洲或东欧来到美国
- 曾在养老院、无家可归者收容所、监狱或其他集体环境中工作或居留过。