¿Cuál son los posibles efectos secundarios de los medicamentos para la infección de TB?

Los efecto secundarios de las pastillas son raros, pero pueden incluir:

- Náuseas
- Vómitos
- Orina oscura
- Erupción cutánea
- Piel y/u ojos amarillos
- Pérdida del apetito
- Manos y/o pies entumecidos

Si presenta alguno de estos efectos secundarios, comuníquelo inmediatamente a su doctor, enfermera o trabajador de la salud capacitado del Departamento de Salud Pública.

¿Cuál es el rol del Departamento de Salud Pública? El Departamento se preocupa por usted y su familia y proporciona tratamientos para la infección por TB. Si recibe tratamiento por parte de Salud Pública, puede ser atendido por un médico o un enfermero que haya recibido capacitación especial en el manejo de pacientes con infección de TB o enfermedad activa de TB.

Para más información sobre la TB, visite:
www.publichealth.lacounty.gov/tb

Infección por TB

Lo que debe saber para cuidar su salud

CDCP-TB-0002-01 (Rev: 04/03/25)

County of Los Angeles Public Health

¿Qué es la infección por TB?

Si ha sido infectado por la tuberculosis (TB), los gérmenes de la TB están "adormecidos" en su cuerpo. Las personas infectadas por la TB no presentan síntomas ni se sienten enfermas, y tampoco pueden transmitir los gérmenes de la TB a otras personas. Sin embargo, si su sistema inmunológico se debilita, esos gérmenes de la TB pueden "despertarse" y multiplicarse. Entonces, desarrollará la enfermedad de la TB activa. Si tiene la TB activa, puede presentar síntomas como una tos persistente, sudoraciones nocturnas, fatiga y pérdida de peso. Además, puede transmitirle los gérmenes de la TB a los demás. La TB afecta principalmente a los pulmones, pero también puede afectar a otras partes de su cuerpo. Si no se trata, la TB puede causar la muerte.

¿Cómo nos infectamos?

Los gérmenes de la TB son diseminados en el aire cuando alguien con TB activa tose, estornuda, se ríe, habla o canta. Usted puede infectarse si respira ese aire con gérmenes de la TB. Ahora bien, la TB no se contagia por contacto físico con ropas, platos, comida, ropa de cama o con personas que tengan la enfermedad de TB activa.



¿Cuál es el tratamiento para la infección por TB?

Si ha sido infectado por gérmenes de la TB, podría enfermarse de TB. Esto puede ocurrir inmediatamente o varios años después. La infección por TB se trata con medicamentos anti-TB. Ahora contamos con tratamientos más cortos que pueden completarse en 3 a 4 meses.

¿Por qué debería tomar medicamentos si no me siento enfermo?

Si no toma las medicinas para su infección por TB, podría desarrollar la enfermedad de la TB activa. Muchos gérmenes de la TB mueren después de comenzar a tomar la medicina, pero algunos permanecen vivos en su cuerpo durante mucho tiempo. Mientras todavía tenga gérmenes de la TB en su cuerpo, estos pueden "despertarse", multiplicarse y enfermarle. Si está tomando medicamentos para la TB, es importante que termine su medicación tal como lo indicó su doctor o proveedor de atención médica.

¿Cómo puedo saber si tengo la infección por TB?

Hágase una prueba de TB en piel o sangre. Si se hace la prueba cutánea, asegúrese de regresar con su doctor a los dos o tres días de recibir sus resultados. Si se hace la prueba en sangre, no es necesario que regrese a la clínica por sus resultados.

¿Cuál es la diferencia entre la infección por TB y la enfermedad de la TB activa?

Infección por TB	Enfermedad de la TB activa
Sin síntomas	Tos persistente por 3 o más semanas
No se siente enfermo	Toser sangre
Prueba de piel o sangre positiva (usualmente)	Prueba de piel o sangre positiva (usualmente)
Radiografía de tórax normal (usualmente)	Radiografía de tórax anormal (usualmente)
No puede transmitir la TB	Falta de apetito
Puede desarrollar TB activa si no completa su tratamiento	Debilidad, fatiga
	Escalofríos, fiebre, sudoraciones nocturnas
	Pérdida de peso

¿Qué hago si el resultado de la prueba cutánea o de sangre sale positivo? Un resultado positivo en una prueba cutánea o de sangre generalmente significa que ha sido infectado con los gérmenes de la TB, pero no necesariamente significa que tiene la enfermedad de la TB activa. Se necesitan otras pruebas, como una radiografía de tórax o una muestra de esputo (flema), para determinar si tiene la enfermedad de la TB activa.

¿Cuándo debería hacerme la prueba cutánea o de sangre?

Debería hacerse la prueba de TB si:

- Tiene síntomas de TB activa.
- Ha pasado mucho tiempo con alguien que tiene TB activa.
- Tiene un sistema inmunológico debilitado, como en caso de VIH o diabetes.
- Se ha inyectado drogas ilegales.
- Ha ingresado a USA recientemente de países de América Latina, el Caribe, África, Asia o Europa del Este.
- Ha trabajado o permanecido en un asilo de ancianos, refugio para personas sin hogar, prisión u otro entorno grupal.