

Латентна

туберкульозна інфекція

Я здоровий.

Збудники туберкульозу “сплять” у моєму організмі, але можуть “прокинутися” в майбутньому.

У мене немає жодних симптомів.

Мій рентгенівський знімок грудної клітки в нормі.

Я не заразний.

У мене позитивний результат шкірного туберкулінового тесту або аналізу крові.

Активна

форма туберкульозу

У мене серйозне захворювання, через яке я можу померти, якщо його не лікувати.


Збудники туберкульозу “прокинулися”.

У мене можуть бути симптоми: кашель, лихоманка, втрата ваги, нічна пітливість.

Мій рентгенівський знімок грудної клітки може мати відхилення.

Я можу бути заразним і заразити інших людей, коли мікроби туберкульозу поширюються через повітря, коли я кашляю, сміюся чи розмовляю.

У мене може бути позитивний результат аналізу мого мокротиння.



Чи може моя **латентна туберкульозна інфекція** (сплячі збудники) прокинутися і заразити мене **активною формою туберкульозу**?

Так, і деякі фактори збільшують ризик!

- Я нещодавно приїхав з іншої країни, де поширений туберкульоз.
- У мене ВІЛ.
- Я був у тісному контакті з людиною, хворою на активну форму туберкульозу.
- У мене цукровий діабет, ниркова недостатність чи рак.
- У мене була операція з видалення частини шлунка.
- Я живу чи працюю у лікарні, в'язниці, центрі реабілітації наркоманів чи притулку.
- Я вживаю ін'єкційні наркотики.
- Мені пересадили орган.
- Я приймаю деякі ліки, які впливають на імунну систему, наприклад преднізон (стероїди) або інші пігулки чи ін'єкції для лікування деяких видів захворювань шкіри, суглобів та шлунково-кишкового тракту.

Якщо у мене **латентна туберкульозна інфекція**, чи можу я зменшити свої шанси захворіти на **активну форму туберкульозу**?

Так, я можу запобігти туберкульозу!

Я можу приймати безпечні, ефективні препарати.

