

# 疫苗

## 適用於孕婦的資訊



如果您懷孕了，疫苗可以保護您和您的寶寶免受可預防疾病的侵害。疫苗教會您的身體識別有害的病毒或細菌，並製造特殊的抗體，讓您和寶寶保持健康。當您在懷孕期間接種疫苗時，您的一些抗體會在出生前傳遞給寶寶。這些抗體為您的寶寶在出生後最初幾個月提供預防嚴重疾病的保護。



### 以下是您需要了解的內容：

- 懷孕期間接種疫苗對孕婦及胎兒是安全的。
- 懷孕期間接種疫苗是保護新生兒免受嚴重疾病侵害的最佳方法，尤其是因為他們還不能接種疫苗。

### 懷孕期間需要接種的疫苗

#### 破傷風、白喉、百日咳 (Tdap) 疫苗：

- 在每次懷孕的第27至36周之間接種Tdap疫苗可以幫助您的寶寶免受百日咳的侵害。
- 百日咳對新生兒是特別嚴重的疾病，可能危及生命。

#### COVID-19 疫苗：

- 在懷孕期間的任何時候都可以安全接種COVID-19疫苗。
- 與非孕婦相比，孕婦更容易罹患COVID-19重症。
- 及時接種最新的COVID-19疫苗可以在新生兒出生後的最初幾個月為他們提供保護，直到您的寶寶能夠接種自己的COVID-19疫苗。


#### 呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗：

- 從9月份到1月份，孕婦在懷孕32周至36周期間可以接種一劑呼吸道合胞病毒疫苗，以保護她們的新生兒免於感染RSV。RSV會導致年幼嬰兒患上細支氣管炎和肺炎。
- 為了預防嬰兒患上嚴重RSV疾病，建議在RSV流行季為孕婦接種RSV疫苗，或者為出生不久的嬰兒注射 **nirsevimab** 進行免疫。大多數嬰兒不需要同時使用兩種免疫方法。



# 疫苗

## 適用於孕婦的資訊



### 流感疫苗：

- 在懷孕期間的任何時候都可以安全接種流感疫苗。
- 孕婦更容易罹患流感重症。
- 與其他年齡段的兒童相比，6個月以下的嬰兒因流感住院的風險最高。
- 接種最新的流感疫苗可以為您和您的新生兒在出生後的最初幾個月提供保護，直到您的寶寶能夠接種自己的流感疫苗。

### B型肝炎疫苗：

以前沒有接種過B型肝炎疫苗的孕婦應該在懷孕期間接種B型肝炎疫苗，以保護自己和嬰兒免受B型肝炎病毒造成的感染和疾病的侵害。B型肝炎會對肝臟造成長期損害。

### 新生兒出生時需要接種的疫苗

#### B型肝炎疫苗：

- 您的新生兒應在出生後24小時內接種第一劑B型肝炎疫苗，以保護他們免於感染B型肝炎。

#### 注射預防RSV的藥物 (Nirsevimab)：

- 如果您在懷孕期間沒有接種RSV疫苗，或者如果您的寶寶在您接種RSV疫苗後的14天內出生，那麼您的新生兒在RSV流行季期間或之前應該注射一劑nirsevimab 以保護他們免於患上嚴重疾病。RSV是新生兒住院的最常見原因。

您的寶寶還將接受抗生素滴眼液，注射維生素K，並接受一次用於新生兒篩查的簡單血液檢查。如果您有任何疑問，請諮詢您的產前保健提供者。



### 公共衛生局呼叫中心

如需更多資訊，公共衛生局呼叫中心的工作時間為每週七天，上午8點至晚上8點，電話號碼是 **1-833-540-0473**。

